

# ***Lesioni cutanee del gatto: infezione da Cowpoxvirus, un pox che colpisce l'uomo, i pets e gli animali esotici***

*Indagine sulla diffusione del CPXV  
nella Toscana e nel Lazio*

Dott.ssa Giusy CARDETI  
IZS del Lazio e della Toscana

**Martedì 20 febbraio 2018**



(Hobi S et al, Br J Der 2015)

## **Programma**

**h.21 - Lesioni cutanee gatto: CPXV e diagnosi differenziale;  
infezioni da CPXV nell'uomo e negli animali.  
Attività dell'IZS Lazio e Toscana.**

**h. 22,30 - Dibattito**

**h. 23,00 - Verifica dell'apprendimento e chiusura dei lavori**

## **Documentazione scientifica**

<http://www.izslt.it/infezioni-da-cowpoxvirus-un-virus-emergente-negli-animali-e-nelluomo/>

# Poxvirus nel gatto in PubMed

- [Poxvirus infection in the domestic cat: some clinical and epidemiological observations.](#)  
127. Bennett M, Gaskell CJ, Gaskell RM, Baxby D, Gruffydd-Jones TJ.  
Vet Rec. 1986 Apr 5;118(14):387-90.  
PMID: 3012851
  
- [Isolation and identification of a poxvirus from a domestic cat and a human contact case.](#)  
128. Egberink HF, Willemse A, Horzinek MC.  
Zentralbl Veterinarmed B. 1986 Apr;33(3):237-40. No abstract available.  
PMID: 3019045
  
- [Poxvirus infection of cats.](#)  
131. Martin WB, Scott FM.  
Vet Rec. 1984 Aug 11;115(6):135. No abstract available.  
PMID: 6089405
  
- [Cowpox infection of cats.](#)  
132. Baxby D.  
Vet Rec. 1984 Jul 28;115(4):91. No abstract available.  
PMID: 6474783
  
- [Poxvirus infection of cats.](#)  
133. Martin WB, Scott FM, Lauder IM, Nash A.  
Vet Rec. 1984 Jul 14;115(2):36. No abstract available.  
PMID: 6089402
  
- [Natural and experimental pox virus infection in the domestic cat.](#)  
134. Gaskell RM, Gaskell CJ, Evans RJ, Dennis PE, Bennett AM, Udall ND, Voyle C, Hill TJ.  
Vet Rec. 1983 Feb 19;112(8):164-70.  
PMID: 6836897
  
- [\[Poxvirus infection in a domestic cat\].](#)  
135. Schönbauer M, Schönbauer-Längle A, Kölbl S.  
Zentralbl Veterinarmed B. 1982 Jul;29(6):434-40. German. No abstract available.  
PMID: 6293223

Acta Virol. **1975** May;19(3):260.

## **Pox infection in carnivora of the family Felidae.**

Marennikova SS, Maltseva NN, Korneeva VI,  
Garanina VM.

## Poxvirus infection in a cat with presumptive human transmission

2011

Vanessa Herder\*, Peter Wohlsein\*, Dorothea Grunwald\*, Hanno Janssen†, Hermann Meyer‡, Philipp Kayser‡, Wolfgang Baumgärtner\* and Andreas Beineke\*



### Introduction

Cowpox viruses (CPV) belong to the genus Orthopoxvirus, family Poxviridae, and are distributed in Asia and Europe, except Ireland.<sup>1,2</sup> Cowpox virus infections affect

Case Series



## Pulmonary cowpox in cats: five cases

Journal of Feline Medicine and Surgery  
1–8  
© ISFM and AAFP 2015  
Reprints and permissions:  
[sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav](http://sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav)  
DOI: 10.1177/1098612X15583344  
jfms.com



Jennie McInerney<sup>1</sup>, Kostas Papasouliotis<sup>2</sup>, Kerry Simpson<sup>3</sup>,  
Kate English<sup>4</sup>, Simon Cook<sup>5</sup>, Elspeth Milne<sup>6</sup>  
and Danielle A Gunn-Moore<sup>6</sup>

NEW MICROBIOLOGICA, 40, 1, 148–150, 2017, ISSN 1121-7138

CASE REPORT

## Cowpox virus infection in a child after contact with a domestic cat: a case report

Ryszard Zaba<sup>1</sup>, Magdalena Jałowska<sup>2</sup>, Michał J. Kowalczyk<sup>1</sup>, Monika Bowszyc-Dmochowska<sup>2</sup>, Zygmunt Adamski<sup>2</sup>, Andrzej Szkaradkiewicz<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Department of Dermatology and Venerology, Poznań University of Medical Sciences, Poland;

<sup>2</sup>Department of Dermatology, Poznań University of Medical Sciences, Poland;

<sup>3</sup>Department of Medical Microbiology, Poznań University of Medical Sciences, Poland



Case Series



## Novel characteristics identified in two cases of feline cowpox virus infection

Craig R Breheny<sup>1</sup>, Victoria Fox<sup>2</sup>, Alice Tamborini<sup>2</sup>,  
Conor O'Halloran<sup>3</sup>, Elise Robertson<sup>2</sup>, Paola Cazzini<sup>4</sup>,  
Daniela Birn-Jeffery<sup>5</sup>, Julia Henkin<sup>6</sup>, Tobias Schwarz<sup>1,3</sup>,  
Tim Scase<sup>7</sup>, Roger Powell<sup>8</sup> and Danièle Gunn-Moore<sup>3</sup>

\*SAGE

Journal of Feline Medicine and Surgery Open Reports  
1–5  
© The Author(s) 2017  
Reprints and permissions:  
[sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav](http://sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav)  
DOI: 10.1177/2056116917717191  
[journals.sagepub.com/home/jfmosopenreports](http://journals.sagepub.com/home/jfmosopenreports)

This paper was handled and processed by the European Editorial Office (ISFM)

for publication in JFMS Open Reports



### Cowpox Virus Infection in Cats: ABCD guidelines on prevention and management

Karin Möstl, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Alan D Radford, Etienne Thiry, Uwe Trynen and Marian C Horzinek  
*Journal of Feline Medicine and Surgery* 2013; 15: 557  
DOI: 10.1177/1098612X13489212

CASE REPORT

2015

BJD  
British Journal of Dermatology

## Neurogenic inflammation and colliquative lymphadenitis with persistent orthopox virus DNA detection in a human case of cowpox virus infection transmitted by a domestic cat

S. Hobi,<sup>1</sup> R.S. Mueller,<sup>1</sup> M. Hill,<sup>1</sup> A. Nitsche,<sup>2</sup> T. Löscher,<sup>3</sup> W. Guggemos,<sup>4</sup> S. Ständer,<sup>5</sup> D. Rjosk-Dendorfer<sup>6</sup> and A. Wollenberg<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Small Animal Medicine Clinic, Centre for Clinical Veterinary Medicine, <sup>3</sup>Department of Infectious Diseases and Tropical Medicine, University Hospital,

<sup>6</sup>Department of Clinical Radiology and <sup>7</sup>Department of Dermatology and Allergology, Ludwig Maximilian University, Veterinärstrasse 13, 80539 Munich, Germany

<sup>2</sup>Robert Koch Institute, Consultant Laboratory for Pox Virus, Centre for Biologic Threats and Special Pathogens 1, Berlin, Germany

<sup>4</sup>Department of Infectious Diseases and Tropical Medicine, Schwabing Hospital, Munich, Germany

<sup>5</sup>Department of Dermatology, University of Münster, Münster, Germany

Centre for Clinical Veterinary Medicine, Ludwig Maximilian University Munich, Munich, Germany<sup>1</sup>

Specialty Practice for Veterinary Pathology, Munich, Germany<sup>2</sup>

Bundeswehr Institute of Microbiology, Munich, Germany<sup>3</sup>

Tierdermatologie Deisenhofen, Deisenhofen, Germany<sup>4</sup>

## Feline cowpoxvirus infections in Germany: clinical and epidemiological aspects

J. Comp. Path. 2018 Vol. 158, 71–76

Available online at [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)

ScienceDirect



INFECTIOUS DISEASE

## Atypical Cowpox Virus Infection in a Series of Cats

N. Jungwirth<sup>\*,†</sup>, C. Puff<sup>\*</sup>, K. Köster<sup>†</sup>, R. Mischke<sup>†</sup>, H. Meyer<sup>†</sup>, A. Stark<sup>†</sup>,  
B. Thoma<sup>†</sup>, G. Zöller<sup>†</sup>, E. Seehusen<sup>\*</sup>, M. Hewicker-Trautwein<sup>\*</sup>,  
A. Beineke<sup>\*,†</sup>, W. Baumgärtner<sup>\*,†</sup> and P. Wohlsein<sup>\*</sup>



# Lesioni cutanee da Cowpox virus nel gatto



Fig 6. Appearance of the cat showing hairless focal lesions over the face  
(Johnson MS et al, JSAP 2009)



(Nitsche A. in Scagliarini A., La Sett.Vet. 2010)



Papule  
ulcerate e  
placche  
crostose

Photographs courtesy of Dr Tim Nuttall BSc BVSc PhD CertVD Cbiol Mbiol MRCVS



**Figure 1.** Facial necrotizing dermatitis in a cat with cowpox virus infection.  
(Herder V et al, Vet Derm. 2011)



**Lesioni crostose da CPV**  
(Mostl K et al, 2013)



**Figure 1** Case 1, a 4-year-old, neutered male Russian Blue cat: this is a photograph of one of the multiple, 2–5 mm diameter, circumscribed, papular skin lesions present on the cat's head and neck. Note that as this is a zoonotic disease gloves should have been worn

(McInerney J et al, JFMS 2015)



**Figure 4** Case 2, a 2-year-old, neutered male Ragdoll cat: this photograph shows some of the many 5–10 mm diameter erythematous, ulcerated skin lesions with necrotic centres that developed overnight on the cat's head, neck and thorax. This picture shows the left side of the cat's neck, which has been shaved, and an oesophageal feeding tube placed, although not yet sutured to the skin



**Figure 3** Case 2: this image depicts the lesions noted on the head, which are typical of cowpox virus dermatopathy. As some of these had been biopsied prior to the photograph having been taken, there are sutures present

(Breheny CR et al, JFMS 2017)



**Fig. 2.** Cutaneous poxvirus infection, case 4. Ventroplantar lesion of the left hindpaw with diffuse, severe dermal hyperaemia and a focal raised, brown, plaque-like lesion (arrow).

(Jungwirth N et al, J Comp Path 2018)

## Infezione da Cowpoxvirus nel GATTO

- Andamento stagionale
- Contagio da topi, ratti e gatti
- Lesioni cute e mucose
- Guarigione in 4-6-8 settimane
- Prognosi infausta nei soggetti giovani o immunocompromessi

[Zentralbl Hyg Umweltmed.](#) 1996 May;198(5):452-61.

full-text

[Serologic studies of domestic cats for potential human pathogenic virus infections from wild rodents].

[Article in German]

[Nowotny N<sup>1</sup>.](#)

Lesioni cutanee (INMI, Progetto di Ricerca 2011)



Muso

Testa

Dorso

Zona mammaria

# Patogenesi e segni clinici (1)

- L'infezione da *Cowpoxvirus* avviene tramite morso o graffio da topo infetto; possibile l'infezione oronasale
- Le lesioni in genere sono localizzate nella zona della testa ma anche su collo e zampe



Fig. 2. (a) Round plaque-like lesion on the face of the cat. (b) Round plaque-like preauricular lesion.

(Hobi S et al, Br J Der 2015)



Fig. 1. Cutaneous poxvirus infection, case 1. Dorsoplantar lesion of the left hind paw showing focal extensive ulceration with diffuse, moderate oedema and diffuse mild hyperaemia.

(Jungwirth N et al, J Comp Path 2018)

- La lesione primaria è in genere una papula o un nodulo ulcerato che compare dopo circa 4-5 giorni di incubazione

# Patogenesi e segni clinici (2)

Può seguire:

- infezione batterica secondaria e/o ascesso o un'area di cellulite
- replicazione virale locale: peggioramento della lesione
- viremia e replicazione nelle cavità nasali, nei polmoni e nei tessuti linfoidi
- 10-14 giorni dopo la lesione primaria: sul corpo, lesioni secondarie quali macule, papule ulcerate, piccoli noduli ulcerati e placche fino ad 1 cm di diametro con rapida formazione di croste

(Breheny CR et al, JFMS 2017)



**Figure 2** Case 2: this image depicts the necrotic eschar which became apparent on day 5

# Segni clinici (forma localizzata)

- Prurito variabile
- Nel 20% dei gatti infetti, vescicole ed ulcere orali (mucosa faringea ed esofagea)
- Le lesioni guariscono lentamente nel giro di 4-5 settimane
- Possono residuare cicatrici e alopecia
- Molti gatti non manifestano alcun segno clinico oltre a quelli cutanei



**Figure 1** Cowpox virus induced skin lesions on the ear. Note that gloves should be worn when examining a cat with a suspected poxvirus infection. Courtesy of Marian C Horznik

(Mostl K. et al., JFMS 2013)

# Segni clinici (forma sistemica)

I segni di una malattia sistemica possono essere modesti con guarigione:

- Lieve piressia, secrezione nasale e oculare

oppure gravi con prognosi infausta:

- Inappetenza, ottundimento del sensorio, diarrea transitoria, polmonite e pleurite essudativa, associata a gravi infezioni batteriche, ad Herpesvirus, a disfunzioni immunitarie da FIV e FeLV, a terapie con glucocorticoidi




Cow pox in a 4-year-old DSH, showing **blepharitis**.  
The condition resolved with no treatment other than nursing care over a 1 month period (<http://vetbook.org>)



## Pulmonary cowpox in cats: five cases

*Journal of Feline Medicine and Surgery*  
1–8  
© ISFM and AAFP 2015  
Reprints and permissions:  
[sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav](http://sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav)  
DOI: 10.1177/1098612X15583344  
[jfrs.sagepub.com](http://jfrs.sagepub.com)  
© SAGE

Jennie McInerney<sup>1</sup>, Kostas Papasouliotis<sup>2</sup>, Kerry Simpson<sup>3</sup>,  
Kate English<sup>4</sup>, Simon Cook<sup>5</sup>, Elspeth Milne<sup>6</sup>  
and Danielle A Gunn-Moore<sup>6</sup>



**Figure 3** This image of case 1, taken post mortem, reveals diffuse, severe pneumonia with many 6–10 mm diameter poxvirus lesions on the surface of the lungs (black arrows). The blue arrow indicates surgical clips following lobectomy


# Diagnosi differenziale (DD)

- Malattie virali (altri *Poxvirus*, *Herpesvirus*, *Calicivirus*)
- Dermatite miliare
- Granuloma eosinofilico
- Xantomatosi cutanea
- Infezioni fungine profonde e sistemiche
- Infezioni batteriche
- Neoplasie (mastocitoma, linfoma)



# DD: Dermatiti virali

- Rare nel gatto
- Sottodiagnosticate?
- Sintomatologia subdola aspecifica
- Iter diagnostico complicato
- Acuta - subacuta - latente cronica
- Giovani -anziani
- Zone colpite: muso e arti
- Lesioni oculari e congiuntivali, apparato respiratorio, cute, mucosa




# Dermatiti virali: *Vaccinia virus, Orf, Raccoonpoxvirus*

## Detection of Vaccinia Virus in Urban Domestic Cats, Brazil

Galileu Barbosa Costa, Júlia Bahia Miranda, Gregório Guilherme Almeida, Jaqueline Silva de Oliveira, Mariana Siqueira Pinheiro, Stefanne Aparecida Gonçalves, Jenner Karlsson Pimenta dos Reis, Ricardo Gonçalves, Paulo César Peregrino Ferreira, Cláudio Antônio Bonjardim, Jônatas Santos Abrahão, Erna Geessien Kroon, Giliane de Souza Trindade

360

Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 23, No. 2, February 2017



**Raccoonpox in a Canadian cat**  
Julie A. Yager\*, Lisa Hutchison and  
John W. Barrett†  
Vet Dermatol 2006

N Z Vet J. 2008 Aug;56(4):196-201. doi:  
10.1080/00480169.2008.36833.

## Recurrent localised cutaneous parapoxvirus infection in three cats.


Fairley RA<sup>1</sup>, Whelan EM, Pesavento PA, Mercer AA.

## Orf parapoxvirus infection from a cat scratch

Frandsen J, Enslow M, Bowen AR  
Dermatology Online Journal 2011; 17 (4): 9

University of Utah, Department of Dermatology, Salt Lake City, Utah

# Dermatiti virali: *Herpesvirus* (1)



- Infezioni da *Herpesvirus* (*FHV-1*)
- Colpito il **naso** e la **cute perioculare**
- Dermatite ulcerativa necrotizzante con o senza anamnesi di sintomatologia respiratoria o oculare
- Occasionalmente provoca ulcere orali e ulcere cutanee superficiali e multiple in tutto il corpo e sulle zampe, secondarie a stress o trauma cutaneo



# Herpesvirus (2)




©Caromyer2222  
<http://pawesomecats.com>



Congiuntivite  
<http://ophtalmoveterinaire>

# Dermatiti virali: *Calicivirus* (1)




Calicivirus Gatto  
© G. Cardeti (IZSLT, Roma)

- **Ulcere orali** più frequenti rispetto FHV-1
- **Malattia delle vie respiratorie superiori:** acuta, lieve e autolimitante, caratterizzata da vescicole/ulcere orali
- Alcuni ceppi virulenti: edema grave ed ulcere su muso e arti; **sintomi sistematici** (febbre, secrezione nasale e oculare, ulcere cavo orale, polmonite, vasculiti periferiche e sistemiche, compromissione organi interni)



[www.gattos.net/blog](http://www.gattos.net/blog)



<http://nefertari40spaceslivecomde.blogspot.it/>

# *Calicivirus* (2)

- **Testa e collo**
- **Vescicole e papule** -> evoluzione in croste, erosioni, ulcerazioni
- Rara dermatite ulcerativo crostosa generalizzata
- Tendente a generalizzare
- Spesso associata **erosione mucosa orale e polpastrelli**
- Concomitante forma respiratoria



Peripheral skin sloughing and ulceration  
at the pad-haired skin junction of P4

<http://vetbook.org>

# *Calicivirus* (3)



Crusted lesions and ulcers due to VS-FCV  
infection ©Tim Gruffydd-Jones



Virulent systemic calicivirus disease,  
excoriations of paws ©Uwe Truyen

# DD: Dermatite miliare



Dermatite da tigna  
[www.animalistiverona.org](http://www.animalistiverona.org)



Lesioni secondarie ad allergia alimentare  
<https://avanzimorivet.it>

# DD: *Granuloma eosinofilico (CGE)*



Pedal eosinophilic granuloma on the paw of a cat with allergic disease.  
[www.icatcare.org](http://www.icatcare.org)

# DD: *Xantomatosi cutanea*



10/2/2018

[www.dermatopatolv.it/casi-clinici/un-caso-di-xantomatosi-cutanea-in-un-gatto/?w2dc\\_action=printlisting](http://www.dermatopatolv.it/casi-clinici/un-caso-di-xantomatosi-cutanea-in-un-gatto/?w2dc_action=printlisting)

Dermatopatologia Veterinaria  Database di Casi Clinici

Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Abramo

Un caso di xantomatosi cutanea in un gatto



Data caso clinico: 11 giugno 2014

Autori:  
Chiara Noli

# DD: Infezioni fungine profonde

## Sporotricosi



<https://lockerdome.com>

# DD: Infezioni fungine sistemiche

## Istoplasmosi



<https://www.amorequattrozampe.it>



<http://www.dermatopatovet.it>

## Criptococcosi



# DD: Infezioni batteriche

- Ascesso sottocutaneo



<https://velvetpets.it>

- Granulomi da mycobatteri opportunistici (mycobatteri atipici)
- Altre infezioni batteriche piogranulomatose:
  - ◆ attinomicosi
  - ◆ nocardiosi



MEDICINA ONLINE

# DD: Neoplasie

## Mastocitoma



<http://www.mylav.net>

## Linfoma cutaneo



<http://www.petsblog.it>

# Diagnosi Infezione da *Cowpoxvirus* (1)

- Quadro clinico e anamnesi: porta a sospetto diagnostico
- Esame citologico delle lesioni ulcerativo-crostose per apposizione diretta o tramite raschiato: spesso non è diagnostico
- I **campioni di cute e/o mucosa** da inviare al laboratorio dovrebbero includere i margini delle lesioni ulcerative più recenti e le lesioni crostose (refrigerati e in formalina)
- Al laboratorio si potrà inviare oltre al campione bioptico:  
raschiato cutaneo in contenitore sterile, ago aspirato, tampone da bordo lesione in soluzione fisiologica o PBS
- Confermano sospetto diagnostico:
  - ✓ **esame istologico**
  - ✓ **microscopia elettronica**
  - ✓ **PCR**
  - ✓ **isolamento in coltura cellulare**

# Diagnosi Infezione da *Cowpoxvirus* (2)

Prelievo di **sangue**:

- la presenza di anticorpi per poxvirus nel siero indica contatto con il virus, ma insufficiente a confermare l'eziologia virale delle lesioni
- anticorpi nel siero: infezione recente (nei sei mesi precedenti)
- titolo anticoorpale positivo circa 7-14 giorni dopo l'esposizione iniziale
- i test sierologici non differenziano *Cowpoxvirus* dagli altri *Orthopoxvirus*



[Vet Microbiol.](#) 1996 Oct;52(3-4):185-200.

A monoclonal blocking-ELISA for detection of orthopoxvirus antibodies in feline sera.

Czerny CP<sup>1</sup>, Wagner K, Gessler K, Mayr A, Kaaden OR.

# Terapia


- Non esiste terapia specifica
- Terapia antibiotica ad ampio spettro e terapia di sostegno con fluidi
- I casi gravi con polmonite possono essere trattati con interferone, ossigenoterapia, analgesia e steroidi per via inalatoria
- Evitare assolutamente la somministrazione di corticosteroidi, a meno che non si somministri anche interferone



# Prevenzione e Disinfezione

- I gatti infetti vanno isolati e maneggiati con attenzione (è una zoonosi) , sempre indossando guanti
- Il virus può resistere nelle croste a basse temperature per anni
- Usare soluzioni a base di ipoclorito di sodio (0,5-5%), sali quaternari di ammonio, idrossido di sodio (0,8%)
- Non viene inattivato da alcool ed etere etilico
- Non esiste un vaccino specifico





Particelle virali immaturoe intracitoplasmatiche  
(Von Bomhard et al., 2010)



## Infezione da Cowpoxvirus nel CANE



### In letteratura descritti rari casi

- Germania, 1991
- Cane meticcio di 5 mesi
- Lesione papulare sul muso
- Gatto convivente infetto

- Regno Unito, 1999
- Doberman-pinscher di 7 anni
- Lesione ulcerativa sul muso 10 mm, no prurito
- Causa: morso di un topo

- Finlandia, 2000
- Bambina di 4 a con grave forma cutanea
- Cane pet: anticorpi 1:320, no lesioni
- Trasmissione cane → uomo?

- Germania, Sassonia 2010
- Rottweiler di 5 mesi
- Lesione nodulare ulcerata 1,5 cm di diametro su arto anteriore, no prurito
- Guarigione in seguito ad escissione
- Ceppo omologo a quello del gatto:  
per cui possibile trasmissione  
cane -> gatto, cane -> uomo, roditori -> cane
- Altri animali in azienda: tutti negativi

# Cowpox with Severe Generalized Eruption, Finland

Paula M. Pelkonen,<sup>\*†</sup> Kyllikki Tarvainen,<sup>‡</sup>  
Arja Hynninen,<sup>‡</sup> Eva R.K. Kallio,<sup>§</sup>  
Heikki Henttonen,<sup>§</sup> Airi Palva,<sup>\*</sup> Antti Vaheri,<sup>†¶</sup>  
and Olli Vapalahti<sup>\*†¶</sup>

Cowpox with a severe, generalized eruption was diagnosed in an atopic 4-year-old girl by electron microscopy, virus isolation, polymerase chain reaction, and immunoglobulin (Ig) M and low-avidity IgG antibodies. The hemagglutinin gene of the isolate clustered with a Russian cowpox virus strain, and more distantly, with other cowpox and vaccinia virus strains. The patient's dog had orthopoxvirus-specific antibodies, indicating a possible transmission route. In Finnish wild rodents, orthopoxvirus seroprevalences were 0%–02%, in humans the seroprevalence was 100% in the age group >50, decreasing towards younger age groups.

1991

- ...Cowpox virus was isolated from a papular skin lesion on the lateral muzzle of a 5-month-old male mixed breed dog in Germany. The owner of the dog and the cat, living in the same household, also had pox-like lesions....

# Veterinary Dermatology

DOI: 10.1111/j.1365-3164.2010.00923.x

## Localized cowpox infection in a 5-month-old Rottweiler

Wolf von Bomhard\*, Elizabeth A. Mauldin<sup>†</sup>,  
Wolfram Breuer<sup>‡</sup>, Stephan Pfleghaar\* and  
Andreas Nitsche<sup>§</sup>

primary lesions are localized to the anterior half of the body, especially paws, face and neck. Subsequently, the lesions disseminate, and multiple crateriform ulcers develop. Most cats recover over an interval of a few days.

## Skin lesions caused by orthopoxvirus infection in a dog

A seven-year-old male dobermann was presented for examination of a non-pruritic ulcerated lesion occurring at the site of a suspected rat bite on the muzzle. Biopsy revealed focal ulcerative dermatitis, with cells in the epidermis, follicular infundibula and interposed sebaceous glands undergoing ballooning degeneration and containing large acidophilic intracytoplasmic structures resembling poxvirus inclusion bodies. The diagnosis of orthopoxvirus infection was confirmed by transmission electron microscopy and immunohistochemistry. The biopsy site healed uneventfully, without evidence of recurrence or development of further cutaneous or internal lesions, and a serum sample collected eight weeks after first presentation had a low titre of poxvirus antibodies. This report demonstrates that orthopoxvirus infection should be considered as a cause of ulcerative skin lesions in dogs, particularly if there has been recent contact with rodents or other small mammals.

K. C. SMITH, M. BENNETT\* AND  
D. C. GARRETT†

*Journal of Small Animal Practice* (1990)  
40, 495–497

### INTRODUCTION

Several outbreaks of orthopoxvirus infection, including both cutaneous and respiratory forms of disease, were recorded in

infection often enters at a pruritic site on the face, neck or paws. Pruritic sites are sometimes described as 'rat bites' or 'fox bites'. Wounds. Most cats recover, but the disease can develop if the cat is treated with corticosteroids or is immunosuppressed (Bennett and others 1990).

Cowpox antibody and the virus have been detected in British *Clethrionomys glareolus*, *F. m. m. mus*, *Micromys minutus* and wood mice (*Apodemus sylvaticus*) (Begon and others 1990, unpublished data), susceptible to experimental infection with cowpox virus (Bennett and others 1990). Small wild mammals are potential reservoirs of infection (Bennett and others 1990).

Reports of orthopoxvirus infection in wild or domestic canids are rare. Orthopoxvirus antibodies were 18·6 per cent of fox sera during a survey of 830 animals in Germany (Henneberg and others 1995). Antibody titres were relatively low, ranging from 1:1 to 1:28 in a specific ELISA. Of 60 fox sera in Germany, 6·7 per cent contained orthopoxvirus antibody (Henneberg and others 1995) and 10·0 per cent of animals (Muller 1990). Antibodies have not been

## Caratteristiche dell'infezione da Orthopox-CPXV nel cane

- Contagio tramite roditore o gatto infetto
- Nodulo solitario, ulcerato, asintomatico
- Lesioni cutanee simili ad un istiocitoma
- Guarigione spontanea



Human infections from dogs have not been reported, largely because the disease is so **rare in dogs** and perhaps because when they are infected, dogs tend to have **very mild disease**.

# Cowpoxvirus



Cow = vacca



## Storia:

- isolato per la prima volta da **lesioni mammarie del bovino**
- utilizzato da Jenner nel 1700 per i suoi studi medici vaccinali pionieristici che hanno condotto al definitivo debellamento del vaiolo
- per decenni non è stato segnalato in tale specie



Curiosità -> per 150 anni: poxvirus Vaccinia = CPXV inoculato nell'Uomo. A metà novecento: riconosciuto specie a sé

# II CPXV in altre spp

## Kuhpockenvirusinfektion bei einem Alpaka (*Vicugna pacos*) – klinische Symptomatik, Diagnostik und pathologische Befunde

(1997)

D. Goerigk<sup>1</sup>, T. Theu<sup>2</sup>, M. Pfeffer<sup>2</sup>, A. Konrath<sup>1</sup>, D. Kalhoff<sup>1</sup>, D. Wolf<sup>1</sup>, T. W. Vahlenkamp<sup>1</sup>, M. Beer<sup>1</sup>, A. Starke<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institution für Klauentiere, Veterinärmedizinische Fakultät, Universität Leipzig; <sup>2</sup>Institut für Vierbeiner-Pathologie, Veterinärmedizinische Fakultät, Universität Leipzig; <sup>3</sup>Institut für Reptilien- und Amphibienpathologie, Veterinärmedizinische Fakultät, Universität Leipzig; <sup>4</sup>Lehr- und Forschungsinstitut für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen, Leipzig; <sup>5</sup>Institut für Virusdiagnostik, Friedrich-Loeffler-Institut, Insel Rügen; <sup>6</sup>Institut für Virologie, Veterinärmedizinische Fakultät, Universität Leipzig

### Schlüsselwörter

Neuweltkameleiden, Orthopoxvirus, Stomatitis, Dermatitis, qPCR

### Zusammenfassung

Beschreibungen von Infektionen mit Orthopockenwirren bei Neuweltkameleiden beschränken sich in der Literatur auf einzelne Fallberichte. Ausgehend von einer generalisierten Kuhpockenvirusinfektion eines Alpakas werden klinische Symptomatik, Diagnostik und pathologische Befunde dargestellt. Laut Vorbericht wurde das Tier bereits über einen

(EID  
2003)

## Cowpox Virus Transmission from Rats to Monkeys, the Netherlands

Byron E.E. Martina,\* Gerard van Doornum,\* Gerry M. Dorresteijn,† Hubert G.M. Niesters,\* Koert J. Stittelaar,\* Marno A.B.I. Wolters,† Hester G.H. van Bolhuis,\* and Albert D.M.E. Osterhaus\*

OPEN ACCESS Freely available online

## Cowpox Virus Outbreak in Banded Mongooses (*Mungos mungo*) and Jaguarundis (*Herpailurus yagouaroundi*) with a Time-Delayed Infection to Humans

Andreas Kurth<sup>1\*</sup>, Martin Straube<sup>2</sup>, Annette Kuczka<sup>3</sup>, Anton Josef Dunsche<sup>4</sup>, Hermann Meyer<sup>5</sup>, Andreas Nitsche<sup>1</sup>

<sup>1</sup> German Consultant Laboratory for Poxviruses, Robert Koch Institute, Berlin, Germany, <sup>2</sup>Zoo Krefeld, Krefeld, Germany, <sup>3</sup>Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper, Krefeld, Germany, <sup>4</sup>Städtisches Klinikum Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, <sup>5</sup>Bundeswehr Institute of Microbiology, Munich, Germany

### Abstract

**Background:** Often described as an CPXV is rodent-borne with a broad including parts with high homology unvaccinated animals and humans

VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES  
Volume 16, Number 6, 2016  
© Mary Ann Liebert, Inc.  
DOI: 10.1089/vbz.2015.1932

## Fatal Cowpox Virus Infection in an Aborted Foal

Annika Franke<sup>1</sup>, Olivia Kershaw<sup>2</sup>, Maria Jenckel<sup>1</sup>, Lydia König<sup>2</sup>, Martin Beer<sup>1</sup>, Bernd Hoffmann<sup>1</sup>, and Donata Hoffmann<sup>1</sup>

212  
Brief Communications and Case Reports  
Vet Pathol 43:212–218 (2006)

212  
Brief Communications and Case Reports  
Vet Pathol 43:212–218 (2006)

212  
Brief Communications and Case Reports  
Vet Pathol 43:212–218 (2006)

## Fatal Poxvirus Outbreak in a Colony of New World Monkeys

.. MÄTZ-RENSING, H. ELLERBROK, B. EH  
AN

**Abstract.** An epizootic infection was observed in various species including a group of marmosets. 20, 30 animals died of unknown diseases. 5

## LETTERS

(EID  
2008)

## Rat-to-Elephant-to-Human Transmission of Cowpox Virus

**To the Editor:** Despite the eradication of smallpox in the past century, other orthopoxviruses, such as monkeypox virus, vaccinia virus in Brazil and cowpox virus (CPVV) in

PLOS ONE  
PVX

## Fatal Outbreak in Tonkean Macaques Caused by Possibly Novel Orthopoxvirus, Italy, January 2015<sup>1</sup>

Giusy Cardeti,<sup>2</sup> Cesare Ernesto Maria Gruber,<sup>2</sup> Claudia Eleni, Fabrizio Carletti, Concetta Castilletti, Iuseppe Manna, Francesca Rosone, Emanuela Giombini, Marina Selleri, Daniele Lapa, Vincenzo Puro, Antonino Di Caro, Raniero Lorenzetti, Maria Teresa Scicluna, Goffredo Grifoni, Annapaoa Rizzoli, Valentina Tagliani Pietra, Lorenzo De Marco, Maria Rosaria Capobianchi, Gian Luca Autonio

THE ROYAL SOCIETY

## Transmission dynamics of a zoonotic pathogen within and between wildlife host species

Michael Begon<sup>1,2\*</sup>, Sarah M. Hazel<sup>1,2,3</sup>, Derrick Baxby<sup>1,4</sup>, Kevin Bown<sup>1,2,3</sup>, Rachel Cavanagh<sup>1,2,3</sup>, Julian Chantrey<sup>1,2,3</sup>, Trevor Jones<sup>1,3</sup> and Malcolm Bennett<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>Centre for Comparative Infectious Diseases, <sup>2</sup>Population Biology Research Group, School of Biological Sciences, Nicholson Building,

<sup>3</sup>Department of Veterinary Pathology, and <sup>4</sup>Department of Medical Microbiology, The University of Liverpool, Liverpool L69 3BX, UK

The transmission dynamics of the cowpox virus infection have been quantified in two mixed populations of bank voles (*Clethrionomys glareolus*) and wood mice (*Apodemus sylvaticus*), through analyses of detailed time-series of the numbers of susceptible, infectious and newly infected individuals. The cowpox virus is a zoonosis which circulates in these rodent hosts and has been shown to have an adverse effect on reproductive



(2017)

### Article

## Epidemiological Investigations of Four Cowpox Virus Outbreaks in Alpaca Herds, Germany

Almut Prkno<sup>1,†</sup>, Donata Hoffmann<sup>2,†</sup>, Daniela Goerigk<sup>3</sup>, Matthias Kaiser<sup>1</sup>, Anne Catherine Franscisca van Maanen<sup>4</sup>, Kathrin Jeske<sup>5</sup>, Maria Jenckel<sup>2</sup>, Florian Pfaff<sup>2</sup>, Thomas W. Vahlenkamp<sup>6</sup>, Martin Beer<sup>2</sup>, Rainer G. Ulrich<sup>5</sup>, Alexander Starke<sup>1</sup> and Martin Pfeffer<sup>4,\*</sup>

## Seasonal recurrence of cowpox virus outbreaks in captive cheetahs (*Acinonyx jubatus*)

(PLOS One 2017)

Julia Stagegaard<sup>1</sup>, Andreas Kurth<sup>2,3</sup>, Daniel Stern<sup>2</sup>, Piotr Wojciech Dabrowski<sup>4</sup>, Ann Pocknell<sup>5</sup>, Andreas Nitsche<sup>2,3\*</sup>, Livia Schrick<sup>2,3</sup>

Table 3

Different hosts of cowpox virus as demonstrated by serological evidence and/or virus isolation.

Order/family	Species	Virus isolated	Proven transmission to men
Primates/ <i>Cercopithecidae</i>	Barbary macaque ( <i>Macaca sylvanus</i> )	No	No
Primates/ <i>Callitrichidae</i>	Marmoset ( <i>Callithrix jacchus</i> )	Yes	No
Carnivora/ <i>Felidae</i>	Cat ( <i>Felis sylvestris f. Catus</i> )	Yes	Yes
	Cheetah ( <i>Acinonyx jubatus</i> )	Yes	Yes
	Lynx ( <i>Lynx lynx</i> )	No	No
	Lion ( <i>Panthera leo</i> )	Yes	No
	Black panther ( <i>Panthera padus</i> )	Yes	No
	Ocelot ( <i>Felis pardalis</i> )	Yes	No
	Jaguar ( <i>Felis onca</i> )	Yes	No
	Puma ( <i>Felis concolor</i> )	Yes	No
	Far eastern cat ( <i>Felis bengalensis</i> )	No	No
	Jaguarundi ( <i>Herpailurus yagouaroundi</i> )	Yes	No
Carnivora/ <i>Herpestidae</i>	Banded mongoose ( <i>Mungos mungo</i> )	Yes	No
Carnivora/ <i>Canidae</i>	Dog ( <i>Canis lupus familiaris</i> )	Yes	No
	Fox ( <i>Vulpes vulpes</i> )	No	No
	Arctic fox ( <i>Alopex lagopus</i> )	No	No
Carnivora/ <i>Mustelidae</i>	Stone marten ( <i>Martes martes</i> )	No	No
Carnivora/ <i>Ailuridae</i>	Bearcat ( <i>Aiulurus fulgens</i> )	Yes	No
Artiodactyla/ <i>Suidae</i>	Wild boar ( <i>Sus scrofa</i> )	No	No
Artiodactyla/ <i>Giraffidae</i>	Okapi ( <i>Okapia johnstoni</i> )	Yes	No
Artiodactyla/ <i>Bovidae</i>	Cow ( <i>Bos taurus</i> )	Yes	Yes
Artiodactyla/ <i>Camelidae</i>	Lama ( <i>Lama glama pacos</i> )	No	No
Perissodactyla/ <i>Equidae</i>	Horse ( <i>Equus caballus</i> )	Yes	No
Perissodactyla/ <i>Rhinocerotidae</i>	Black rhinoceros ( <i>Diceros bicornis</i> )	Yes	No
	White rhinoceros ( <i>Ceratotherium s. simum</i> )	Yes	No
Perissodactyla/ <i>Tapiridae</i>	Tapir ( <i>Tapirus indicus</i> )	Yes	No
Proboscidea/ <i>Elephantidae</i>	Asian elephant ( <i>Elephas maximus</i> )	Yes	Yes
	African elephant ( <i>Loxodonta africana</i> )	Yes	No
Pilosa/ <i>Myrmecophagidae</i>	Anteaters ( <i>Myrmecophaga tridactyla</i> )	No	No
Rodentia/ <i>Castoridae</i>	Beaver ( <i>Castor fiber canadensis</i> )	Yes	No
Rodentia/ <i>Arvicolidae</i>	Bank voles ( <i>Myodes glareolus</i> )	No	No
	Gray-sided vole ( <i>Clethrionomys rufocanarius</i> )	No	No
	Red-backed voles ( <i>C. rutilus</i> )	No	No
	Field vole ( <i>Microtus agrestis</i> )	Yes	No
	Root vole ( <i>Microtus oeconomus</i> )	No	No
Rodentia/ <i>Muridae</i>	Wood mice ( <i>Apodemus sylvaticus</i> )	No	No
	Yellow-necked mice ( <i>Apodemus flavicollis</i> )	No	No
	House mice ( <i>Mus musculus</i> )	No	No
	Common rat ( <i>Rattus norvegicus</i> )	Yes	Yes
	Giant gerbil ( <i>Rhombomys opimus</i> )	Yes	No
	Gerbil ( <i>Meriones lybicus</i> )	Yes	No
Rodentia/ <i>Sciuridae</i>	Ground squirrel ( <i>Citellus fulvus</i> )	No	No
Rodentia/ <i>Caviidae</i>	Patagonian cavy ( <i>Dolichotis patagonum</i> )	No	No
Insectivora/ <i>Soricidae</i>	Common shrew ( <i>Sorex araneus</i> )	No	No

Review

Veterinary Microbiology 140 (2010) 229–236

## Zoonotic poxviruses\*

Sandra Essbauer\*, Martin Pfeffer, Hermann Meyer

# Reports on spread of CPXV in western European rodents and carnivores

Country	Mode of detection	Reservoir
Great Britain	Serologic testing and PCR	Bank voles (prevalence in autumn, 80%), wood mice (prevalence, 27%), and short-tailed field voles ( <i>Clethrionomys glareolus</i> , <i>Apodemus sylvaticus</i> , and <i>Microtus agrestis</i> ; prevalence, 99% [11 of 12])
Germany	Serologic testing	Cats (prevalence, 2% [44 of 2173])
Norway	Serologic testing	Wild carnivores (red foxes [ <i>Vulpes vulpes</i> ]; prevalence, 11% [7 of 62]) and domestic cats (prevalence, 10.1% [ $n = 217$ ])
Finland	Serologic testing and PCR	Rodents (mainly bank voles [ <i>Clethrionomys glareolus</i> ]; prevalence, 0%–92%, depending on population dynamics; high prevalence during the peak phase of population for red foxes (prevalence, 50% [7 of 14]) and lynx (prevalence, 1.4% [1 of 73]))
Sweden	Serologic testing	Lynx (prevalence, 29%; [5 of 17]) and brown bears (prevalence, 2%; [1 of 45])
Germany	Serologic testing	Red foxes (prevalence, 6.5% [46 of 703])
Austria	Serologic testing	Domestic cats (prevalence, 4% [8 of 200])

bank voles



wood mice



field voles



Red foxes  
(*Vulpes vulpes*)



# Zoonotic poxviruses infection in humans

**Table 1**  
Genera of the family Poxviridae, subfamily Chordopoxvirinae, which contain virus species that are pathogenic to humans.

Genus and virus species	Geographical distribution	Host	Reservoir
<b>Orthopoxvirus</b>			
Variola virus	Eradicated	Human	None
Monkeypox virus	Africa, (USA) <sup>a</sup>	Human, primates (see Table 2)	Squirrels, dormice, gambian giant rat, hedge hog, Jerboa, opossum, woodchuck (see Table 2)
Cowpox virus	Western Eurasia	Human, cat, cow, elephant and zoo animals (see Table 3)	Rodents (see Table 3)
Vaccinia virus <sup>b</sup> (~buffalopox)	Worldwide	Humans, cattle, buffalos, rabbit	Most likely rodents
<b>Parapoxvirus</b>			
Orf virus (contagious ectyma, contagious pustular dermatitis)	Worldwide	Humans, sheep, goat, artiodactyla, ruminant	Unknown?
Bovine papular stomatitis virus	Worldwide	Humans, cattle	Unknown?
Pseudocowpox virus (paravaccinia, melkers nodule)	Worldwide	Humans, cattle	Unknown?
Parapoxvirus of seals	Worldwide	Humans, seals	Unknown?
Parapoxvirus of reindeer	Finland	Humans, reindeer	Unknown?
<b>Molluscipoxvirus</b>			
Molluscum contagiosum virus	Worldwide	Humans	No
<b>Yatapoxvirus</b>			
Tanapox virus	Africa	Humans	Mosquitoes?, rodents?
Yaba-like disease virus	Africa	Primates	Unknown?
Yaba monkey tumor virus	Africa	Primates	Unknown?

<sup>a</sup> Import of MPXV to the USA with gambian giant rats.

<sup>b</sup> Buffalopox virus is a name historically used for VACV infections in buffalos and sometimes defined as a sub-species of VACV. Because buffalopox virus is officially not a taxonomically assigned name, we here use the phrase buffalopox for the clinical presentation of a VACV infection in buffalos.

# Famiglia Poxviridae

Sottofamiglia Chordopoxvirinae: 8 generi di cui 4 patogeni anche per l'Uomo

Genere	Specie	Ospiti non umani	Note
Orthopoxvirus	Variola virus (maior e minor) – VARV	No	Smallpox: estinto (bioterrorismo)
	Monkeypoxvirus – MPXV	Primenti non umani (NHP)	USA, Africa; reservoir: roditori africani
	Vaccinia poxvirus - VACV	Bovini, bufalo, coniglio	Usato come vaccino; in Brasile: cavalli, bovini, uomo, roditori
	Camelpox – CMLV	Cammello	Reservoir: animali selvatici?
	<b>Cowpoxvirus – CPXV</b>	<b>Bovini, gatto, cane, cavallo, capra, felidi selvatici, camelidi nuovo mondo, animali esotici (felidi, NHP, formichieri), roditori</b>	<b>Europa: sieropositività in cani, volpi, cavalli, arvicole.</b> <b>Reservoir: piccoli roditori</b>
Molluscipoxvirus	Virus Mollusco Contagioso - MOCX	Primenti non umani	Africa; soggetti immunodepressi
Parapoxvirus	Orf virus – ORFV	Pecore, capre, renne	Nodulo del mungitore
	Pseudocowpoxvirus – PCPV	Bovino	
	Virus Stomatite papulare bovina – BPSV	Bovino	
Yatapoxvirus	Tanapoxvirus – TANV	Roditori	Trasmessi da insetti; Africa e Asia; lesioni simil-tumorali nel sottocute
	Yaba monkey tumorvirus – YMTV	Primenti non umani	

Genere ORTHOPOXVIRUS: 9 specie di cui 5 patogene per l'Uomo

Specie COWPOX VIRUS (200x350 nm; dsDNA, lineare 230 kbp)

# Situazione Epidemiologica


Zoonosi endemica: Nord Europa, aree occidentali ex URSS e zone adiacenti Asia settentrionale e centrale



negli ultimi anni, circa 200 casi umani in Gran Bretagna, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Norvegia, Russia e Italia. Casi recenti: Russia e Germania 2015, Polonia 2017

*Epidemiol. Infect.* (2017), 145, 755–759. © Cambridge University Press  
doi:10.1017/S0950268816002922

## **SHORT REPORT** **Cowpox in a human, Russia, 2015**



Case Report

**Two Distinct Clinical Courses of Human Cowpox,  
Germany, 2015**



**Lesioni di 7 gg all'avambraccio**  
(Pelkonen P et al, Finlandia 2003)



**Lesioni necrotiche e linfangite su collo e clavicola**  
(Vogel S et al, Germania 2012)

## Infezione da Cowpoxvirus nell'UOMO

- Colpiti soprattutto soggetti giovani
- Contagio da gatti, ratti domestici, animali esotici; non ancora dimostrato da uomo a uomo
- Lesioni spesso su cute, mano e collo dopo 4-14 gg
- Linfadenite e sintomi influenzali
- Guarigione spontanea in 6-12 settimane
- Prognosi infastidiva in soggetti immunocompromessi o sotto terapia cortisonica



### **Generalized cowpox infection in a patient with Darier disease**

British Association of Dermatologists 2011 **164**, pp1107–1124

DOI: 10.1111/j.1365-2133.2011.10226.x



Fig 1. Partially crusted papules, pustules and vesicles (a) in the face and (b) on the shoulder at the time of hospitalization.

# Generalised cowpox virus infection



Lisa-Lena Grönemeyer, Anne Baltzer, Sigrid Broekaert, Livia Schridl, Lars Möller, Andreas Nitsche, Retraut Mössner, Michael P Schön, Timo Böhl

A 24-year-old man presented to our dermatology clinic lymphoma, diabetes, and malnutrition) were negative. *Lancet 2017; 390: 1769*

Journal of Clinical Virology 40 (2007) 160–162

## Short communication

# Viremia in human Cowpox virus infection

Andreas Nitsche\*, Andreas Kurth, Georg Pauli



Case Report

## Two Distinct Clinical Courses of Human Cowpox, Germany, 2015

Ines Eder<sup>1</sup>, Patrick Vollmar<sup>2</sup>, Martin Pfeffer<sup>3</sup>, Philipp Naether<sup>4</sup>, Arne Christian Rodloff<sup>1</sup> and Hermann Meyer<sup>5,\*</sup>

<sup>1</sup> Institute of Medical Microbiology and Epidemiology of Infectious Diseases, University Hospital, 04103 Leipzig, Germany; [ines.eder@medizin.uni-leipzig.de](mailto:ines.eder@medizin.uni-leipzig.de) (I.E.); [acr@medizin.uni-leipzig.de](mailto:acr@medizin.uni-leipzig.de) (A.C.R.)

<sup>2</sup> Central Diagnostic Laboratory Division, Bundeswehr Institute of Microbiology, 80937 Munich, Germany; [patrick.vollmar@bundeswehr.org](mailto:patrick.vollmar@bundeswehr.org)

<sup>3</sup> Institute of Animal Hygiene and Veterinary Public Health, University of Leipzig, 04103 Leipzig, Germany; [pfeffer@vetmed.uni-leipzig.de](mailto:pfeffer@vetmed.uni-leipzig.de)

<sup>4</sup> Ear, Nose and Throat Clinic, University Hospital, 04103 Leipzig, Germany; [philippnaether@gmail.com](mailto:philippnaether@gmail.com)

<sup>5</sup> Department of Viruses and Intracellular Agents, Bundeswehr Institute of Microbiology, 80937 Munich, Germany

\* Correspondence: [hermann1meyer@bundeswehr.org](mailto:hermann1meyer@bundeswehr.org); Tel.: +49-89-992692-3910



Figure 1. Photographs of the clinical course of cowpox in a veterinary assistant (Case 1), taken on Day 10 (a), Day 13 (b), Day 20 (c), Day 30 (d), Day 47 (e), Day 84 (f), Day 89 (g), Day 210 (h), and Day 326 (i).



Figure 1 - 11-year-old boy with cowpox lesion. An ulcerated inflammatory lesion located on the chin after direct contact with a domestic cat. A) Note the black scab on the top of the lesion. B) Skin lesion after scab detachment.

(Zaba R et al., 2017)

## SHORT REPORT Cowpox in a human, Russia, 2015

A. Y. POPOVA<sup>1,2</sup>, R. A. MAKSYUTOV<sup>3\*</sup>, O. S. TARANOV<sup>3</sup>,  
T. V. TREGUBCHAK<sup>3</sup>, A. V. ZAIKOVSKAYA<sup>3</sup>, A. A. SERGEEV<sup>3</sup>,  
I. V. VLASHCHENKO<sup>4</sup>, S. A. BODNEV<sup>3</sup>, V. A. TERNOVOI<sup>3</sup>,  
N. S. ALEXANDROVA<sup>5</sup>, A. L. TARASOV<sup>1</sup>, N. V. KONOVALOVA<sup>1</sup>,  
A. A. KOROLEVA<sup>4</sup>, L. E. BULYCHEV<sup>3</sup>, O. V. PYANKOV<sup>3</sup>, Y. V. DEMINA<sup>1,2</sup>,  
A. P. AGAFONOV<sup>3</sup>, S. N. SHCHELKUNOV<sup>3,6</sup> AND V. N. MIHEEV<sup>3</sup>

## Severe Ocular Cowpox in a Human, Finland

Paula M. Kinnunen, Juha M. Holopainen, Heidi Hemmilä, Heli Piiparien, Tarja Sironen, Tero Kivelä, Jenni Virtanen, Jukka Niemimaa, Simo Nikkari, Asko Järvinen, Olli Vapalahti

Author affiliations: University of Helsinki, Helsinki, Finland (P.M. Kinnunen, J.M. Holopainen, H. Piiparien, T. Sironen, T. Kivelä, J. Virtanen, O. Vapalahti), Finnish Defence Forces, Helsinki (P.M. Kinnunen, H. Hemmilä, H. Piiparien, S. Nikkari); Helsinki University Hospital, Helsinki (J.M. Holopainen, T. Kivelä, A. Järvinen, O. Vapalahti); Natural Resources Institute Finland (Luke), Vantaa, Finland (J. Niemimaa)

DOI: <http://dx.doi.org/10.3201/eid2112.150621>

*Lancet Infect Dis* 2010; 10: 288

## Human cowpox in a veterinary student

Martin Glatz, Susanne Richter, Gabriele Ginter-Hanselmayer, Werner Aberer, Robert R Mülliger

## Cowpox after a cat scratch – case report from Poland

Karolina Świtaj<sup>1</sup>, Piotr Kajfasz<sup>1</sup>, Andreas Kurth<sup>2</sup>, Andreas Nitsche<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Department of Zoonotic and Tropical Diseases, Medical University of Warsaw, Poland

<sup>2</sup> Robert Koch Institute, Center for Biological Threats and Special Pathogens, Highly Pathogenic Viruses, Berlin, Germany

## Infezione da Cowpoxvirus nel *Rattus norvegicus* "nuovo" Pet

*R. norvegicus* = ratto grigio o delle fogne e ratto da compagnia (*fancy rat*)

Infezione per **contatto diretto** con lesioni cutanee o fuci e per **aerosol**.

Lesioni più frequenti: **ulcere e croste su muso, orecchie, zampe**.  
Manca il prurito, possibili congiuntivite e rinite.

**Guarigione spontanea** delle lesioni cutanee; se forma generalizzata,  
esito fatale.



Lesioni zampe

(Campe H et al, Germania 2009)



Ratto domestico: lesioni cutanee sulle zampe  
(Vogel S et al, Germania 2012)



Lesioni cutanee su muso di ratto  
(Nitsche A. in Scagliarini A. La Settimana Veterinaria, 2010)

# Provvedimenti legislativi - Europa e Italia

Allerta 02/2009 DG SanCo:  
Commissione europea: invito agli  
Stati Membri di incrementare la  
vigilanza



Baviera e Renania, 2008



Oise, Noire e Loiret, 2008

Dir. Gen. Sanità Animale-Farmaco  
Veterinario: nota informativa del  
Ministero della Salute 0002658-P-  
13/02/2009 con scheda riguardante la  
malattia nell'uomo





# Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E  
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario  
Ufficio VIII

Uffici veterinari per gli Adempimenti comunitari (UVAC).  
Loro sedi:

Oggetto: **casi umani di Cowpox virus in Francia e in Germania a seguito di contatti con ratti (“pet rats”) introdotti dalla Repubblica Ceca.**

La Commissione europea ha informato in merito a taluni recenti casi negli uomini di infezioni da cowpox virus dovuti a contatti diretti con ratti (“pet rats”).

I casi in questione si sono verificati in Germania (“Bavaria e North Rhine Westphalia”) e in Francia (12 casi) nei Dipartimenti di “Oise, Nord e Loiret”.

I ratti sono stati acquistati in diversi negozi che hanno introdotto tali animali da una struttura ubicata nella città di Kolín, nella Repubblica Ceca.

Le Autorità della Repubblica Ceca, a seguito delle indagini esperite, hanno comunicato che i Paesi interessati dalle spedizioni degli animali sospetti risultano la Francia, la Germania, il Belgio e l’Olanda e che, comunque, nel proprio territorio, nessun caso umano di infezione da cowpox virus è stato riscontrato né sono stati rilevati nelle aziende casi di malattia nei ratti.

Si può sottolineare, pertanto, come, alla luce delle informazioni finora acquisite, l’Italia non sia stata interessata dalle introduzioni degli animali a rischio.

Appare importante mettere in evidenza altresì che le Autorità francesi hanno informato che diversi ratti (“pet rats”), entrati in contatto con gli uomini risultati in seguito infetti, hanno mostrato sintomatologia respiratoria prima della morte.

Tutto ciò rilevato la Commissione europea ha comunque invitato tutti gli Stati membri ad incrementare la vigilanza sensibilizzando altresì i proprietari dei negozi degli animali in questione nonché gli acquirenti dei roditori in merito alle misure di igiene preventiva.

Si chiede pertanto agli Enti in indirizzo, in relazione alle loro prerogative e nell’ambito delle attività cui sono preposti, di prestare particolare attenzione alle movimentazioni commerciali degli animali di cui trattasi, sia per quanto concerne le introduzioni dai Paesi membri e sia nelle successive fasi di commercializzazione nei negozi.

Alla FNOVI e all’ANMVI si chiede altresì di portare a conoscenza degli episodi sopra delineati i veterinari liberi professionisti in considerazione dell’importante ruolo svolto dagli stessi nel monitoraggio e nella gestione dello stato sanitario degli animali d’affezione e compagnia e per i rapporti tenuti con i proprietari degli animali nello svolgimento della loro professione.

## Infezione rara a sud delle Alpi in Italia descritti pochi casi

Alcuni dati rivelano la circolazione autoctona di orthopoxvirus nel Nord-Est d'Italia

Due casi notificati nel 2005 e 2007 in Friuli Venezia Giulia:  
da gatto a studente di veterinaria e da gatto a medico veterinario

Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 15, No. 3, March 2009

### **Cat-to-Human Orthopoxvirus Transmission, Northeastern Italy**

Fabrizio Carletti, Licia Bordi,  
Concetta Castilletti,  
Antonino Di Caro,  
Laura Falasca, Cristiana Gioia,  
Giuseppe Ippolito,  
Stefania Zaniratti,  
Anna Beltrame, Pierluigi Viale,  
and Maria Rosaria Capobianchi

Zoonosi ed infezioni virali esotiche:  
fronteggiare le emergenze attraverso un approccio integrato tra medicina umana  
e veterinaria

P2 INMI Innovative protocols to improve diagnosis and therapy of zoonotic and arthropod-borne viral infections

Work Package 3: Evaluate the relevance of orthopoxviral zoonosis transmitted by wild and domestic animals to humans in Italy



**GATTI: CARATTERISTICHE EPIDEMIOLOGICHE**

Età (media)na)	6 anni (range, 1- 19 anni)
Gatto domestico	134 (59.2%)
Domicilio in zona rurale	108 (52.2%)
Contatti con altri gatti	173 (76.5%)
Contatti con roditori	163 (72.1%)

n=226

Positività sierologica per orthopoxvirus (Ab NT >20) = 44/226 (19.5%)

Veterinari

Positività sierologica per orthopoxvirus (titolo neutralizzante >20) = 11 (28.9%)

La percentuale di sieroprevalenza decresce con l'avanzare dell'età

Castilletti C,  
comunicazione  
all'evento  
"Infezione da  
OPV zoonosici"  
03/12/15

nel 2011, nuovo caso in  
un gatto del Friuli  
Venezia Giulia; nessuna  
trasmissione all'uomo  
(Castilletti 2011, dati non pubblicati)



..... in Italia .....

## Cowpoxvirus nel Lama (*Lama glama*)

Luglio 2009

- ✓ Azienda in prov. di Viterbo (circa 580 animali)
- ✓ Virus isolato da 5 lama su 7 presenti
- ✓ Morti 3 soggetti
- ✓ Presenza di Ac nei 4 lama sopravvissuti, negative altre spp animali esaminate
- ✓ Ac in 2 delle 4 persone a contatto



Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 17, No. 8, August 2011

### **Cowpox Virus in Llama, Italy**

Giusy Cardeti, Alberto Brozzi, Claudia Eleni,  
Nicola Polici, Gianlorenzo D'Alterio,  
Fabrizio Carletti, Maria Teresa Scicluna,  
Concetta Castilletti, Maria R. Capobianchi,  
Antonino Di Caro, Gian Luca Autorino,  
and Demetrio Amaddeo

Cowpox virus (CPXV) was isolated from skin lesions of a llama on a farm in Italy. Transmission electron microscopy showed brick-shaped particles consistent with orthopoxviruses. CPXV-antibodies were detected in llama and human serum samples; a CPXV isolate had a hemagglutinin sequence identical to CPXV-MonKre08/1-2-3 strains isolated from banded mongooses in Germany.



## Cowpoxvirus nel Lama (2) (*Lama glama*)



Lesioni congiuntivali di Lama

© D'Alterio, Italia 2009

Lesioni crateriformi (Lama)  
© D'Alterio G, Viterbo, 2009



- Lesioni crateriformi 0,5 cm, localizzate su tutto il corpo; soprattutto: muso, padiglioni auricolari, congiuntiva, mammella e cute perianale
  - abbattimento, anoressia, decubito e morte in circa 10 giorni
  - guarigione spontanea delle lesioni cutanee nei 2 malati e sopravvissuti
  - Esaminati piccoli roditori (44 ratti e 31 topi): tutti negativi

..... in Italia .....

Nel 2014 due ceppi di CPXV sono stati identificati in 2 bovini e 2 capre in Sicilia




Figure 3. Phylogenetic tree generated from alignment of complete orthopoxvirus (OPV) *Rpo\_18* gene sequence using the neighbor-joining method and the Tamura 3-parameter model of nucleotide substitution, implemented in MEGA 6.<sup>7</sup> The percentage of replicate trees in which the associated taxa clustered together in the bootstrap test (1,000 replicates) is shown above the branches (cutoff 60%). Dots indicate the viral strains described in our study.

## Evidence of zoonotic *Poxviridae* coinfections in clinically diagnosed papillomas using a newly developed mini-array test

Journal of Veterinary Diagnostic Investigation  
2016, Vol. 28(1) 59–64  
© 2015 The Author(s)  
Reprints and permissions:  
[sagepub.com/journalsPermissions.nav](http://sagepub.com/journalsPermissions.nav)  
DOI: 10.1177/1040638715614604  
[jvdi.sagepub.com](http://jvdi.sagepub.com)


Alessandra Scagliarini,<sup>1</sup> Giovanni Casà, Bernadette Trentin, Laura Gallina,  
Federica Savini, Marine Morent, Antonio Lavazza, Roberto Puleio,  
Calogera Buttaci, Vincenza Cannella, Giuseppa Purpari, Patrizia Di Marco,  
David Piquemal, Annalisa Guercio

# ..... in Italia ..... Cowpox virus in Macachi di Tonkeana (Macaca tonkeana)

Gennaio 2015

■ Gennaio 2015


■ in un **Centro di ricovero e recupero per animali selvatici ed esotici**, in un'area boschiva dell'**Italia centrale**



- In 2 settimane, 12 macachi di un gruppo di 18 animali, sono morti tra le 48 ore e 12 giorni dalla comparsa dei sintomi
- Grave depressione, forma respiratoria, vomito e sintomi neurologici


# Papule eritematosi e pustole

- su mucosa gengivale
- su regione inguinale



Lesioni cutanee e organi principali  
processati per:

- **esame istologico** (ematossilina-eosina)
- **esami virologici**



# Dati Epidemiologici

- N.30 animali selvatici e gatti randagi del Centro  
→ sieri **negativi al test di sieroneutralizzazione**

**Table 2.** Serologic analysis of serum samples collected from various mammal species housed at animal sanctuary, Italy, January 2015

Species	Virus neutralization test, no. positive/no. total	Antibody titer*
Wolf	0/1	Negative
Llama	0/8	Negative
Roe deer	0/1	Negative
Mouflon	0/1	Negative
Goat	0/4	Negative
Badger	0/1	Negative
Donkey	0/2	Negative
Cat	0/12	Negative
Total	0/30	

\*Threshold dilution was 1:4.



- N.62 primati nonumani del Centro, sieri in IFA  
→ IgG positivi 29,03%



**Table 3.** Serologic analysis of serum samples from nonhuman primate species housed at animal sanctuary, Italy, January 2015\*

Species	IFA IgM test, no. positive/no. total (%)	IgM titer†	IFA IgG test, no. positive/no. total (%)	IgG titer, † range
Tonkean macaque ( <i>Macaca tonkeana</i> )	0/30	Negative	8/30	1:40–1: 640
Cynomolgus macaque ( <i>M. fascicularis</i> )	0/11	Negative	3/11	1:20–1:160
Barbary macaque ( <i>M. sylvanus</i> )	2/12	1:20	2/12	1:20
Rhesus macaque ( <i>M. mulatta</i> )	0/1	Negative	1/1	1:80
Japanese macaque ( <i>M. fuscata</i> )	0/2	Negative	2/2	1:80
Tufted capuchin ( <i>Sapajus apella</i> )	0/4	Negative	2/4	1:20
Grivet ( <i>Cercopithecus aethiops</i> )	0/1	Negative	0/1	Negative
Hamadryas baboon ( <i>Papio hamadryas</i> )	0/1	Negative	0/1	Negative
Total	2/62 (3.22)		18/62 (29.03)	

\*IFA, immunofluorescence antibody.

†Threshold dilution was 1:20.

# Protocollo Vaccinale

- 91 NHP vaccinati con Vaccino IMVANEX® (Bavarian Nordic A/S)

Specie	N. animale	Immunofluorescenza IgM T0/T30/T90	Immunofluorescenza IgG T0/T30/T90	N. (%) con aumento IgG
Tonkean macaque ( <i>Macaca tonkeana</i> )	4	Neg/1:20/neg Neg/neg/neg Neg/neg/neg Neg/neg/neg	Neg/1:20/1:320 Neg/1:20/1:80 Neg/1:20/1:80 Neg/1:20/1:40	4 (100)
Cynomolgus macaque ( <i>M. fascicularis</i> )	5	Neg/1:20/1:20 Neg/1:80/1:80 Neg/neg/neg Neg/1:20/1:20 Neg/neg/neg	1:20/1:320/1:320 1:20/1:80/1:80 Neg/1:20/1:80 Neg/1:20/1:80 Neg/1:80/1:160	5 (100)
Barbary macaque ( <i>M. sylvanus</i> )	1	Neg/neg/neg	1:20/1:20/1:80	1 (100)



**Table 5.** Immunofluorescence antibody testing of vaccinated nonhuman primates after outbreak at animal sanctuary, Italy, January 2015\*


Species	No. animals	IgM, T0/T30/T90	IgG, T0/T30/T90	No. (%) with IgG increase
Tonkean macaque ( <i>Macaca tonkeana</i> )	4	Neg/1:20/neg Neg/neg/neg Neg/neg/neg Neg/neg/neg	Neg/1:20/1:320 Neg/1:20/1:80 Neg/1:20/1:80 Neg/1:20/1:40	4 (100)
Cynomolgus macaque ( <i>M. fascicularis</i> )	5	Neg/1:20/1:20 Neg/1:80/1:80 Neg/neg/neg Neg/1:20/1:20 Neg/neg/neg	1:20/1:320/1:320 1:20/1:80/1:80 Neg/1:20/1:80 Neg/1:20/1:80 Neg/1:80/1:160	5 (100)
Barbary macaque ( <i>M. sylvanus</i> )	1	Neg/neg/neg	1:20/1:20/1:80	1 (100)

\*Threshold dilution for antibody titers was 1:20. Neg, negative; T0, first immunization; T30, booster dose administration; T90, blood collection 60 d after T30.

# Fatal Outbreak in Tonkean Macaques Caused by Possibly Novel Orthopoxvirus, Italy, January 2015<sup>1</sup>

Giusy Cardeti,<sup>2</sup> Cesare Ernesto Maria Gruber,<sup>2</sup> Claudia Eleni, Fabrizio Carletti, Concetta Castilletti, Giuseppe Manna, Francesca Rosone, Emanuela Giombini, Marina Selleri, Daniele Lapa, Vincenzo Puro, Antonino Di Caro, Raniero Lorenzetti, Maria Teresa Scicluna, Goffredo Grifoni, Annappaola Rizzoli, Valentina Tagliapietra, Lorenzo De Marco, Maria Rosaria Capobianchi, Gian Luca Autorino

**Figure 6.** Phylogenetic analysis of OPV Abatino obtained from skin lesion of Tonkean macaque during outbreak at animal sanctuary, Italy, January 2015. Nine conserved genes (GenBank accession nos. KY100107–KY100115) obtained with next-generation sequencing were concatenated and aligned with the homologous concatenated sequences from representative OPV strains (GenBank accession no.): TATV-Dahomey-1968 (DQ437594.1), VARV-Bangladesh-1975 (L22579.1), CMLV-M96 (AF438165.1), CPXV-HumAac09-1 (KC813508.1), CPXV-Germany2002-MKY (HQ420898.1), CPXV-Germany1998-2 (HQ420897.1), CPXV-MarLei07-1 (KC813499.1), MPXV-Congo2003-358 (DQ011154.1), CPXV-Finland2000 (HQ420893.1), VACV-Lister (KX061501.1), ECTV-Moscow (AF012825.2), OPV GCP2013 Akhmeta (KM046934-42), and OPV Tena Dona AK2015 (KX914668-76). New World strain RACV-MD19 (GenBank accession no. FJ807746-54) was added to the analysis as an outgroup. We generated multiple alignments with MUSCLE version 3.8.31 (30) and built the phylogenetic tree by using the Bayesian Markov chain Monte Carlo model with MRBAYES version 3.2.5 (31) using the general time-reversible plus gamma model with 1 million generations, retaining a minimum of 10,000 posterior probabilities, and maximum-likelihood model RAxML version 8.1.24 (32) using the general time-reversible plus gamma with 1,000 pseudoreplicates. Numbers represent the reliability of the nodes with the minimum probability of 75% and minimum bootstrap value of 75. Scale bar indicates nucleotide substitutions per site. CMLV, camelpox virus; CPXV, cowpox virus; ECTV, ectromelia virus; MPXV, monkeypox virus; OPV, orthopoxvirus; RACV, raccoonpox virus; TATV, taterapox virus; VACV, vaccinia virus; VARV, variola virus.



## ..... in Italia .....

Nel 2016, lesioni cutanee sospette prelevate dal **muso** di un gatto in provincia di Siena, sono state inviate per diagnosi all'Università di Bari

Isolato e tipizzato un Orthopoxvirus molto simile al ceppo OPV Abatino (comunicazioni personali; in pubblicazione)



Specie esotiche-selvatiche da cui è stato isolato il virus

Elefante asiatico (*Elephas maximus*)  
Elefante africano (*Loxodonta africana*)  
Leone (*Panthera leo*)  
Pantera nera (*Panthera pardus*)  
Ghepardo (*Acinonyx jubatus*)  
Puma (*Felis concolor*)  
Giaguaro (*Panthera onca*)  
Ghepardo (*Acinonyx jubatus*)  
Ocelot (*Leopardus pardalis*)  
Gatto del Bengala (*Felis bengalensis*)  
Lince (*Lynx lynx*)  
Okapi (*Okapia johnstoni*)  
Formichiere gigante (*Myrmecophaga tridactyla*)  
Rinoceronte nero (*Diceros bicornis*)  
Rinoceronte bianco (*Ceratotherium s. simum*)  
Lama (*Lama glama*)  
Alpaca (*Vicugna pacos*)  
Marà (*Dolichotis patagonum*)  
Panda rosso (*Ailurus fulgens*)  
Castoro (*Castor fiber, C. canadensis*)  
Macaco (*Macaca spp.*)  
Scimmie cappuccine (*Cebus spp.*)  
Mangusta (*Mungos mungo*)  
Jaguarundi (*Herpailurus yagouaroundi*)

# Infezione da Cowpoxvirus


## ANIMALI ESOTICI e SELVATICI

### Giardini Zoologici

Infezione per contatto con ratti malati o loro feci e con altri animali infetti



Lesione occhio elefante  
(Kurth A et al, EID 2008)



(Plos One 2017)

Fig 2. Exemplary clinical presentations for typical (A) and non-typical (B) poxvirus lesions observed during the outbreaks. A. Progression of the infection observed for Nova (cluster 5) from d2 when typical dermal nodules were clearly visible, d8 at the peak of clinical disease with multiple classical skin wounds, and d52 with remaining pox scars. Lesions were predominantly located in the face of the animal but were also distributed over the body and legs. B. Atypical ulcerative skin lesions observed on Sheppard (cluster 1). The lesion on the lower lip is shown in the inset on the right for better visibility. (d = days after first clinical signs).

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187089.g002>

## CPXV - animali esotici e selvatici (2)



Lesioni su muso e lingua di Jaguarundi  
(Kurth et al, Germania 2009)



Lesioni su muso e corpo di Mangusta striata  
(Kurth et al, Germania 2009)

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS one

### Cowpox Virus Outbreak in Banded Mongooses (*Mungos mungo*) and Jaguarundis (*Herpailurus yagouaroundi*) with a Time-Delayed Infection to Humans

Andreas Kurth<sup>1\*</sup>, Martin Straube<sup>2</sup>, Annette Kuczka<sup>3</sup>, Anton Josef Dunsche<sup>4</sup>, Hermann Meyer<sup>5</sup>, Andreas Nitsche<sup>1</sup>

<sup>1</sup> German Consultant Laboratory for Poxviruses, Robert Koch Institute, Berlin, Germany, <sup>2</sup> Zoo Krefeld, Krefeld, Germany, <sup>3</sup> Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper, Krefeld, Germany, <sup>4</sup> Städtisches Klinikum Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, <sup>5</sup> Bundeswehr Institute of Microbiology, Munich, Germany

#### Abstract

**Background:** Often described as an extremely rare zoonosis, cowpox virus (CPXV) infections are on the increase in Germany. CPXV is rodent-borne with a broad host range and contains the largest and most complete genome of all poxviruses, including parts with high homology to variola virus (smallpox). So far, most CPXV cases have occurred individually in unvaccinated animals and humans and were caused by genetically distinguishable virus strains.

- Lesioni localizzate su muso, orecchie, zampe, mucosa oro-faringea.
- Possibili sintomi respiratori e gastroenterici o morte improvvisa.
- **Guarigione spontanea** delle lesioni cutanee; se interessamento generale, esito spesso letale.



FIG 1: Female adult squirrel monkey (*Saimiri sciureus*) with multifocal to regionally extensive, well-demarcated areas of alopecia and ulceration of the skin

Veterinary Record (2011) 169, 156b

## Fatal cowpox virus infection in two squirrel monkeys (*Saimiri sciureus*)

S. J. Girling, R. Pizzi, A. Cox, P. M. Beard

## Piccoli roditori: veri reservoir del CPXV

### Indagini sierologiche:

Europa - alta sieroprevalenza in:

- **arvicole** (*Clethrionomys glareolus, Microtus agrestis*)
- **topi selvatici** (*Apodemus sylvaticus*) e domestici (*Mus musculus*)
- **ratto** (*Rattus norvegicus*)
- **lemming** (*Lemmus lemmus*)



### Indagini virologiche (Hoffmann et al, J Virol 2015):

mostrata recettività a 3 ceppi di CPXV:

- **arvicola** (*Microtus arvalis*)
- **ratto Wistar** (*Rattus norvegicus*)



Epidemiol. Infect. (1995), 115, 185-191  
Copyright © 1995 Cambridge University Press

#### Serological evidence for the reservoir hosts of cowpox virus in British wildlife

A. C. CROUCH<sup>1,2,\*</sup>, D. BAXBY<sup>1\*</sup>, C. M. McCACKEN<sup>2,3</sup>, R. M. GASKELL<sup>2</sup> AND M. BENNETT<sup>3</sup>

Departments of Medical Microbiology<sup>1</sup>, Veterinary Pathology<sup>2</sup> and Veterinary Clinical Science and Animal Husbandry<sup>3</sup>, University of Liverpool, PO Box 147, Liverpool L69 3BX, UK

(Accepted 15 March 1995)

#### SUMMARY

The reservoir host of cowpox virus in Western Europe is not known, but epidemiological evidence from human and feline infections indicates that the virus is probably endemic in small wild rodents. Therefore, serum and tissue samples

# Una Zoonosi emergente

Crescente popolarità di ratti e animali esotici  
da compagnia  
ridotta cross-protezione per cessata profilassi antivaiolosa

aumentato rischio per l'uomo di contrarre l'infezione da  
CPXV

inclusa tra le Zoonosi emergenti in Europa

## Il virus

- ✓ **Molte varianti:** molte spp animali sensibili; più specie di CPXV?
- ✓ **Basso tasso di mutazione:** ma frequenti ricombinazioni inter e intramolecolari, delezioni, inserzioni
- ✓ **Varianti diverse che circolano nella stessa area**

Perché  
zoonosi  
emergente?

## L'infezione

- **Alto titolo virale negli animali infetti**
- **Ampio spettro d'ospite**
- **Stop alla vaccinazione contro il VARV**
- **Nicchia ecologica lasciata libera dallo Smallpox**
- **Soggetti immunocompromessi e con dermatiti atopiche**

# Infezione da Cowpoxvirus negli animali: studi sulla presenza e diffusione del virus in Italia Centrale

Durata 36 mesi:

inizio 01/10/2014 -> termine: 30/09/2018

Attività distribuite tra le 5 U.O.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

- U.O. IMS 1 - **Biotecnologie**, dott.ssa Giusy Cardeti (responsabile scientifico)
- U.O. IMS 2 - **Lab. Anatomo-Istopatologia**, dott.ssa Claudia Eleni
- U.O. IMS 3 - **Osservatorio Epidemiologico**, dott.ssa Paola Scaramozzino
- U.O. IMS 4 - **INMI-IRCCS, Laboratorio di Virologia**,  
dott.ssa Concetta Castilletti
- U.O. EMS 1 - **ASL Roma 3, Canile sovrazonale**,  
dott.ssa Livia Malandrucco




Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani"  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico





# Obiettivi del Progetto



## Generali


- **Sensibilizzare i medici umani e veterinari alla zoonosi**
- **raccogliere dati sulla diffusione del CPXV in Zoo e Centri di ricovero e recupero di animali esotici, tra i gatti e i "nuovi" pets della provincia di Roma, nelle persone a contatto con animali infetti**
- **riscontrare sieropositività** in specie animali domestiche e selvatiche, alloctone e/o sinantropi, ed esotiche
- **analizzare i fattori di rischio** associati alla prevalenza della suddetta infezione.



# Obiettivi del Progetto

## Specifici

- Mettere a punto **tecniche biomelocolari** per la diagnosi di CPXV
- **Correlare filogeneticamente** i ceppi identificati a quelli precedentemente isolati in Italia ed Europa



# Raccolta e invio di **Campioni** per indagini di laboratorio

## Animali campionati:

- Gatti di colonia e padronali
- Animali esotici sia detenuti in Giardini zoologici, Centri di Ricovero e Recupero e simili, che nuovi "Pets"
- Animali selvatici, sinantropi e alloctoni con lesioni sospette
- Uomo



## Materiale biologico da inviare all'IZS LT

Lesioni cutanee o mucose: raschiato, ago aspirato, biopsia, tampone da bordo lesione (in 1 mL di soluzione fisiologica o PBS in provetta chiusa ermeticamente).

Essudato: aspirare con una siringa ed inviare tal quale.

Sangue: per ricerca di anticorpi nel siero da animali con lesioni cutanee; da gatti di colonia, ratti, topi e animali esotici-selvatici.

Organi di animali deceputi: se sospetto clinico-anatomopatologico di CPXV, prelevare polmone, fegato, milza, intestino, coagulo intracardiaci.

### Condizioni per il prelievo:

usare sempre **DPI**: trattandosi di un virus zoonosico, indossare almeno guanti e camice



# Esempi di Lesioni cutanee

## Condizioni di invio:

- refrigerato (se entro 24 ore) oppure congelato, in contenitore infrangibile ed a chiusura ermetica
- quando possibile, in formalina per l'esame istologico.

## - compilare Scheda raccolta dati

sito [www.izslt.it](http://www.izslt.it) →

Servizi e Modulistica → Modulistica e referti online ->  
Progetto Cowpoxvirus negli animali RC LT 03-13 → Schede  
Cowpoxvirus → Sch. di raccolta dati ..... Gatto-Anim Esot-Selv




(Hobi S et al, Br J Der 2015)



Lesioni cutanee (Macaco)

Lesioni crateriformi (Lama)  
© D'Alterio G, Viterbo, 2009



Indirizzo da dove sono stati rilevati i campioni e diffusione del virus nella sezione - IZSLT ESOT/RC

Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
della Lazio e della Toscana M. Alessandri

Dato invio: \_\_\_\_\_

Scheda di raccolta dati anamnestici e di campionamento

**GATTO**

Matrikel-Nr.: \_\_\_\_\_

Dati Residente	Dati Proprietario/Responsabile
Attributore Use	Nome e Cognome
Infruttato	Indirizzo
CAP..... Comune	Prov. ....
Telefono .....	Fax .....
Email .....	Email .....
C.E.P. V.A.	C.E.P. V.A.

**Gatto**

Danneggiato dal gatto/Ubicazione e dimensione della colonna lesiva:

Nome..... Età..... Altezza..... Specie.....

Razza.....

Sexo: M ♂ F ♀      Età del gatto: ..... anni      probabile: D      Verità: C

è proprietario       Assunto all'esterno      Si:  NO:   
data: \_\_\_\_\_       vive con altri gatti      Si:  NO:   
 è colona/petite

Gatto che vive con altri animali:      Reddito: C      Altro: Specie.....  
Anno esposto: C      Città: \_\_\_\_\_

Gatto che ha avuto contatto con topo/la ratti: Si:  NO:   
data: \_\_\_\_\_

Gatto che ha presentato nei suoi cani/piccoli problemi lesioni ulcerative su cute ed occhi: Si:  NO:   
data: \_\_\_\_\_

**Tipo campione conforme**

Sangue/urino (I)       Tempore (II)       Condizioni di invio campione

Agg. escrementi (III)       Erosione (IV)       Aggregato compagno (V)

Necessario (VI)       Formulazione (VII)

Indirizzo da dove sono stati rilevati i campioni e diffusione del virus nella sezione - IZSLT ESOT/RC

Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
della Lazio e della Toscana M. Alessandri

Data invio: \_\_\_\_\_

Scheda di raccolta dati anamnestici e di campionamento

**Animali esotici**

Dati Residente	Dati Struttura/Responsabile/Proprietario
Attributore Use	Registrazione Numero di Cognome
Infruttato	Indirizzo
CAP..... Comune	Prov. ....
Telefono .....	Fax .....
Email .....	Email .....
C.E.P. V.A.	C.E.P. V.A.

**Dati Anamnestici**

Specie/animale..... Identificazione.....

Sexo: M ♂ F ♀      Età: ..... anni      probabile: D      Verità: C

L'animale potrebbe aver avuto contatto con topi/la ratti: Si:  NO:   
data: \_\_\_\_\_

Il gatto è immunizzato: \_\_\_\_\_

Condati o latte da produzione dell'alimento (denominazione, indirizzo): \_\_\_\_\_

L'animale ha presentato nell'ultimo periodo le seguenti lesioni ulcerative su cute ed occhi: Si:  NO:   
data: \_\_\_\_\_


**Condizioni di invio campione**

Sangue/urino (I)       Tempore (II)       Aggregato compagno (V)



Agg. escrementi (III)       Erosione (IV)       Formulazione (VII)

## Esami di laboratorio:


- visualizzazione diretta ed identificazione, su base morfologica, di CPXV al **Microscopio Elettronico**
- isolamento del virus in **Coltura cellulare**





- **Esame istologico**



- tipizzazione del ceppo virale isolato, mediante tecniche di **Biologia molecolare** (PCR Real Time e Sequenziamento)




- evidenziazione di **Anticorpi specifici** mediante SN e IF




## Osservazione al Microscopio Elettronico a Trasmissione



**Philips EM 208**



**Cowpoxvirus Lama**  
© G. Cardeti (IZSLT, Roma)






**Orthopoxvirus Macaco**  
© G. Cardeti (IZSLT, Roma)

## Isolamento su Colture cellulari

Due linee cellulari di mammifero: **Vero e BHK<sub>21</sub>**




Effetto citopatico caratterizzato da *lisi cellulare*

BHK<sub>21</sub>



ECP su BHK21

Vero




ECP su Vero


# Esame Istologico

Porzioni di lesioni cutanee fissate in formalina, incluse in paraffina, tagliate e colorate con ematossilina - eosina


Evidenziati corpi inclusi intracitoplasmatici ed eosinofilici negli strati basale e spinoso dell'epidermide



Corpi inclusi da CPXV - Lama  
© C. Eleni - IZSLT, Roma





Corpi inclusi da CPXV - Mangusta  
Schmiedeknecht et al, VetPat. 2010



## Analisi biomolecolare

DNA virale totale estratto dal materiale patologico e analizzato mediante Real-Time PCR specifica per una regione del gene *crmB* dell'Orthopoxvirus



**Phylogenetic analysis of whole-genome sequences of Orthopoxviruses.** CPXV clades (25, 28) are displayed in different colors . RatPox09, FM2292 and BR are highlighted in bold and darker colors. The Variola virus (VARV), Camelpox virus (CMLV), Taterapox virus (TATV), Vaccinia virus (VAVC), Ectromelia virus (ECTV) and Monkeypox virus (MPXV) clusters are presented as collapsed clades and include available whole-genome sequences in GenBank. (Hoffmann et al., 2015)

## Indagini Sierologiche

Uomo:

- comparsa di Anticorpi dopo circa 7 giorni
- cross-immunità con Vaccino Vaiolo umano





Test di Sieroneutralizzazione -> Anticorpi IgG

Test di Immunofluorescenza -> Anticorpi IgM e IgG

Campioni di sangue di:

- gatti di colonie feline (ASL Roma 3 ed altre richiedenti)
- gatti padronali con lesioni sospette (ASL e ambulatori)
- animali esotici, selvatici, alloctoni (giardini zoologici e ambulatori; coagulo intracardiaci in sede autoptica)




## Indagine Epidemiologica

Disegno del campionamento nelle popolazioni feline di colonia nella ASL Roma 3

Preparazione delle Scheda di Raccolta dati nel Gatto e negli Animali esotici

### Risultati attesi:

- Prima stima attendibile di sieroprevalenza di Cowpoxvirus in Italia Centrale
- Eventuale analisi dei fattori di rischio grezzi "orientativi" (età, provenienza, numerosità delle colonie, ambiente urbano-rurale ecc..)
- partecipazione allo studio allargata ad altre ASL/province: estensione dei risultati attesi e confronto tra aree



# Pubblicazioni scientifiche Eventi formativi, Collaborazioni

Giardini zoologici che collaborano al Progetto

**Bioparco di Roma**



**Giardino Faunistico Piano dell'Abatino, Rieti**

**Giardino Zoologico di Pistoia**



**Parco Zoo delle Star, Aprilia**



**CRASE di Semproniano, Grosseto**

...e con i risultati ottenuti,  
costituire la "base line" per la  
messa a punto di idonei  
**programmi di prevenzione dei**  
casi di malattia nell'uomo e negli  
animali sul territorio...



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*



Ordine dei Medici Veterinari della  
Provincia di Pisa

Grazie  
a tutti coloro che collaborano al progetto

Accettazione di Roma



Ufficio di staff Biotecnologie

Laboratorio di Anatomo-Istopatologia

Ufficio di staff Osservatorio Epidemiologico

ASL Roma 3 - Canile sovrazonale

Istituto Nazionale Malattie Infettive di Roma

Direzione Operativa  
Diagnosi Malattie Virali



Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani"  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

dott.ssa Terracciano  
dott. Attuali

a voi per la vostra attenzione  
e... futura collaborazione

contatto: [giusy.cardeti@izslt.it](mailto:giusy.cardeti@izslt.it)

