

Lesioni cutanee del gatto: infezione da Cowpox virus, un pox che colpisce l'uomo, i pets e gli animali esotici

*Indagine sulla diffusione del CPXV
nella Toscana e nel Lazio*

Dott.ssa Giusy CARDETI
IZS del Lazio e della Toscana
Rieti, giovedì 29 marzo 2018



(Hobi S et al, Br J Der 2015)

Programma

**h.19,00 - Lesioni cutanee gatto: CPXV e diagnosi differenziale;
infezioni da CPXV nell'uomo e negli animali.
Attività dell'IZS Lazio e Toscana.**

h.20,30 - Dibattito

h.21,00 - Verifica dell'apprendimento e chiusura dei lavori

Documentazione scientifica

<http://www.izslt.it/infezioni-da-cowpoxvirus-un-virus-emergente-negli-animali-e-nelluomo/>

Poxvirus nel gatto in PubMed

- [Poxvirus infection in the domestic cat: some clinical and epidemiological observations.](#)
127. Bennett M, Gaskell CJ, Gaskell RM, Baxby D, Gruffydd-Jones TJ.
Vet Rec. 1986 Apr 5;118(14):387-90.
PMID: 3012851

- [Isolation and identification of a poxvirus from a domestic cat and a human contact case.](#)
128. Egberink HF, Willemse A, Horzinek MC.
Zentralbl Veterinarmed B. 1986 Apr;33(3):237-40. No abstract available.
PMID: 3019045

- [Poxvirus infection of cats.](#)
131. Martin WB, Scott FM.
Vet Rec. 1984 Aug 11;115(6):135. No abstract available.
PMID: 6089405

- [Cowpox infection of cats.](#)
132. Baxby D.
Vet Rec. 1984 Jul 28;115(4):91. No abstract available.
PMID: 6474783

- [Poxvirus infection of cats.](#)
133. Martin WB, Scott FM, Lauder IM, Nash A.
Vet Rec. 1984 Jul 14;115(2):36. No abstract available.
PMID: 6089402

- [Natural and experimental pox virus infection in the domestic cat.](#)
134. Gaskell RM, Gaskell CJ, Evans RJ, Dennis PE, Bennett AM, Udall ND, Voyle C, Hill TJ.
Vet Rec. 1983 Feb 19;112(8):164-70.
PMID: 6836897

- [\[Poxvirus infection in a domestic cat\].](#)
135. Schönbauer M, Schönbauer-Längle A, Kölbl S.
Zentralbl Veterinarmed B. 1982 Jul;29(6):434-40. German. No abstract available.
PMID: 6293223

Acta Virol. **1975** May;19(3):260.

Pox infection in carnivora of the family Felidae.

Marennikova SS, Maltseva NN, Korneeva VI,
Garanina VM.

Lesioni cutanee da Cowpox virus nel gatto



Fig 6. Appearance of the cat showing hairless focal lesions over the face
(Johnson MS et al, JSAP 2009)



(Nitsche A. in Scagliarini A., La Sett.Vet. 2010)



Papule
ulcerate e
placche
crostose

Photographs courtesy of Dr Tim Nuttall BSc BVSc PhD CertVD Cbiol Mbiol MRCVS



Figure 1. Facial necrotizing dermatitis in a cat with cowpox virus infection.
(Herder V et al, Vet Derm. 2011)



Lesioni crostose da CPXV
(Mostl K et al, JFMS 2013)



Figure 1 Case 1, a 4-year-old, neutered male Russian Blue cat: this is a photograph of one of the multiple, 2–5 mm diameter, circumscribed papular skin lesions present on the cat's head and neck. Note that as this is a zoonotic disease gloves should have been worn

(McInerney J et al, JFMS 2015)



Figure 4 Case 2, a 2-year-old, neutered male Ragdoll cat: this photograph shows some of the many 5–10 mm diameter erythematous, ulcerated skin lesions with necrotic centres that developed overnight on the cat's head, neck and thorax. This picture shows the left side of the cat's neck, which has been shaved, and an oesophageal feeding tube placed, although not yet sutured to the skin



Figure 3 Case 2: this image depicts the lesions noted on the head, which are typical of cowpox virus dermatopathy. As some of these had been biopsied prior to the photograph having been taken, there are sutures present

(Breheny CR et al, JFMS 2017)



Fig. 2. Cutaneous poxvirus infection, case 4. Ventroplantar lesion of the left hindpaw with diffuse, severe dermal haemorrhage and a focal raised, brown, plaque-like lesion (arrow).

(Jungwirth N et al, J Comp Path 2018)

Contagio e Lesione primaria

- L'infezione da *Cowpox virus* avviene tramite morso o graffio da topo infetto; è possibile l'infezione oronasale
- Le lesioni in genere sono localizzate nella zona della **testa** ma anche su **collo e zampe**



Fig. 2. (a) Round plaque-like lesion on the face of the cat. (b) Round plaque-like preauricular lesion.



(Hobi S et al, Br J Der 2015)



Fig. 1. Cutaneous poxvirus infection, case 1. Dorsoplantar lesion of the left hind paw, showing focal extensive ulceration with diffuse, moderate oedema and diffuse mild hyperaemia.

(Jungwirth N et al, J Comp Path 2018)

- La lesione primaria è in genere una papula o un nodulo ulcerato che compare dopo circa 4-5 giorni di incubazione

Patogenesi ed evoluzione

Può seguire:

- infezione batterica secondaria e/o ascesso o un'area di cellulite
- replicazione virale locale: peggioramento della lesione
- viremia e replicazione nelle cavità nasali, nei polmoni e nei tessuti linfoidi
- 10-14 giorni dopo la lesione primaria: sul corpo, lesioni secondarie quali **macule**, **papule ulcerate**, piccoli **noduli ulcerati** e **placche** fino ad 1 cm di diametro con rapida formazione di croste

(Breheny CR et al, JFMS 2017)



Figure 2 Case 2: this image depicts the necrotic eschar which became apparent on day 5

Segni clinici (forma localizzata)

- Prurito variabile
- Nel 20% dei gatti infetti, vescicole ed ulcere orali (mucosa faringea ed esofagea)
- Le lesioni guariscono lentamente nel giro di 4-5 settimane
- Possono residuare cicatrici e alopecia
- Molti gatti non manifestano alcun segno clinico oltre a quelli cutanei



Figure 1 Cowpox virus induced skin lesions on the ear. Note that gloves should be worn when examining a cat with a suspected poxvirus infection. Courtesy of Marian C Horzník

(Mostl K. et al., JFMS 2013)

Segni clinici (forma sistemica)

I segni di una malattia sistemica possono essere modesti con guarigione:

- Lieve piressia, secrezione nasale e oculare

oppure gravi con prognosi infausta:

- **Inappetenza, ottundimento del sensorio, diarrea transitoria, polmonite e pleurite essudativa, associata a gravi infezioni batteriche, ad Herpesvirus, a disfunzioni immunitarie da FIV e FeLV, a terapie con glucocorticoidi**



Cow pox in a 4-year-old DSH, showing **blepharitis**.
The condition resolved with no treatment other than nursing care over a 1 month period (<http://vetbook.org>)



Case Series

Pulmonary cowpox in cats: five cases

Jennie McInerney¹, Kostas Papasouliotis², Kerry Simpson³,
Kate English⁴, Simon Cook⁵, Elspeth Milne⁶
and Danielle A Gunn-Moore⁶

Journal of Feline Medicine and Surgery
1–8
© ISFM and AAFP 2015
Reprints and permissions:
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1098612X15583344
jfms.com
© SAGE




Figure 3 This image of case 1, taken post mortem, reveals diffuse, severe pneumonia with many 6–10 mm diameter poxvirus lesions on the surface of the lungs (black arrows). The blue arrow indicates surgical clips following lobectomy

Riassumendo -> Infezione da Cowpox virus nel GATTO

- Andamento stagionale
- Contagio da topi, ratti e gatti
- Lesioni cutane (e mucose); forma respiratoria
- Guarigione in 4-6-8 settimane
- Prognosi infausta nei soggetti giovani o immunocompromessi

Zentralbl Hyg Umweltmed. 1996 May;198(5):452-61.

[Serologic studies of domestic cats for potential human pathogenic virus infections from wild rodents].

[Article in German]

Nowotny N¹.

Lesioni cutanee (INMI, Progetto di Ricerca 2011)



2 Forme Cliniche inusuali

- A
- Disfonia e stridore inspiratorio intermittente
 - Massa edematosina in laringe
 - Guarigione in circa 4 settimane con terapia

- B
- Lesioni cutanee su regione mammaria caudale, testa, collo
 - Sintomi neurologici (anisocoria)
 - Eutanasia per peggioramento e mancata risposta ad ogni terapia

Case Series



Novel characteristics identified in two cases of feline cowpox virus infection

Craig R Breheny¹, Victoria Fox², Alice Tamborini²,
Conor O'Halloran³, Elise Robertson², Paola Cazzini⁴,
Daniela Birn-Jeffery⁵, Julia Henkin⁶, Tobias Schwarz^{1,3},
Tim Scase⁷, Roger Powell⁸ and Danièle Gunn-Moore³

Journal of Feline Medicine and Surgery: Open Reports
1-6 © The Author(s) 2017
Reprints and permission:
sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/2055116917717710
jfm.sagepub.com/home/jfmopenreports
This paper was handled and processed by the European Editorial Office (ISEM)
for publication in JFMS Open Reports

SAGE

Diagnosi differenziale (DD)


Lesioni cute - mucosa

- Malattie virali (altri *Poxvirus*, *Herpesvirus*, *Calicivirus*)
- Dermatite miliare
- Granuloma eosinofilico
- Xantomatosi cutanea
- Infezioni fungine profonde e sistemiche
- Infezioni batteriche
- Neoplasie (mastocitoma, linfoma)



DD: Dermatiti virali

- Rare nel gatto
- Sottodiagnosticate?
- Sintomatologia subdola, aspecifica
- Iter diagnostico complicato
- Acuta - subacuta - latente cronica
- Giovani - anziani
- Zone colpite: muso e arti
- Lesioni oculari e congiuntivali, apparato respiratorio, cute, mucosa




Dermatiti virali: *Vaccinia virus*, *Orf*, *Raccoonpox virus*

Detection of Vaccinia Virus in Urban Domestic Cats, Brazil

Gallie Barbosa Costa, Júlia Bahia Miranda, Gregório Guilherme Almeida, Jaqueline Silva de Oliveira, Mariana Siqueira Pinheiro, Stefanne Aparecida Gonçalves, Jenner Karlsson Pimenta dos Reis, Ricardo Gonçalves, Paulo César Peregrino Ferreira, Cláudio Antônio Bonjardim, Jônatas Santos Abrahão, Erna Geessien Kroon, Giliane de Souza Trindade

360

Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 23, No. 2, February 2017



We performed a retrospective study of serum samples from 277 house cats, collected during September 2012–December 2014 in 5 states in Brazil (online Technical Appendix Figure 1, <https://wwwnc.cdc.gov/EID/article/23/2/16-1341-Techapp1.pdf>). The states in this study were those whose veterinary clinics agreed to submit samples. We screened serum samples for neutralizing antibodies by using a ≥70% plaque-reduction neutralization test (9). To detect VACV DNA in serum samples, we performed real-time PCR targeting the C11R and A56R genes (9). We directly sequenced A56R fragments in both orientations and in triplicate by using the Mega-BACE sequencer (GE Healthcare, Buckinghamshire, UK). We used ClustalW (<http://www.genome.jp/tools/clustalw>) and MEGA7 software (<http://www.megasoftware.net>) to analyze sequence data.

N Z Vet J. 2008 Aug;56(4):196-201. doi: 10.1080/00480169.2008.36833.

Recurrent localised cutaneous parapoxvirus infection in three cats.

Fairley RA¹, Whelan EM, Pesavento PA, Mercer AA.

Orf parapoxvirus infection from a cat scratch


Frandsen J, Enslow M, Bowen AR
Dermatology Online Journal 2011; 17 (4): 9

University of Utah, Department of Dermatology, Salt Lake City, Utah

Raccoonpox in a Canadian cat

Julie A. Yager*, Lisa Hutchison and John W. Barrett†
Vet Dermatol 2006

Dermatiti virali: *Herpesvirus* (1)



- Infezioni da *Herpesvirus* (*FHV-1*)
- Colpito il **naso** e la **cute perioculare**
- **Dermatite ulcerativa necrotizzante** con o senza anamnesi di sintomatologia respiratoria o oculare
- Occasionalmente provoca ulcere orali e ulcere cutanee superficiali e multiple in tutto il corpo e sulle zampe, secondarie a stress o trauma cutaneo



Kalumet, 18.06.05



Clinical features of FeHV-1 associated dermatitis. Compendium July 2013
www.vetfolio.com

Herpesvirus (2)




©Caromyer2222
<http://pawesomecats.com>



Congiuntivite
<http://ophtalmoveterinaire>

Dermatiti virali: *Calicivirus*




Calicivirus Gatto
© G. Cardeti (IZSLT, Roma)

- **Ulcere orali più frequenti rispetto FHV-1**
- **Malattia delle vie respiratorie superiori:** acuta, lieve e autolimitante, caratterizzata da vescicole/ulcere orali
- Alcuni ceppi virulenti: edema grave ed ulcere su muso e arti; **sintomi sistematici** (febbre, secrezione nasale e oculare, ulcere cavo orale, polmonite, vasculiti periferiche e sistemiche, compromissione organi interni)



www.gattos.net/blog



<http://nefertari40spaceslivecomde.blogspot.it/>

Calicivirus → Lesioni cutanee

- su Testa e collo
- Vescicole e papule → evoluzione in erosioni, ulcerazioni, croste
- Rara dermatite ulcerativo-crostosa generalizzata
- Spesso associata erosione mucosa orale e polpastrelli
- Concomitante forma respiratoria



Peripheral skin sloughing and ulceration
at the pad-haired skin junction of P4

<http://vetbook.org>

Calicivirus (3)



Crusted lesions and ulcers due to VS-FCV
infection ©Tim Gruffydd-Jones



Virulent systemic calicivirus disease,
excoriations of paws ©Uwe Truyen

DD: Dermatite miliare *-> cause molteplici*



Dermatite da tigna
www.animalistiverona.org



Lesioni secondarie ad allergia alimentare
<https://avanzimorivet.it>

- Croste quasi puntiformi su dorso, collo e tronco
- frequentemente associata a prurito
- secondariamente: alopecia, escoriazioni ed erosioni

DD: Granuloma eosinofilico (CGE)

- Placche rilevate lineari, ulcerate, nodulari su muso, cavo orale, cuscinetti plantari
- A volte prurito



Pedal eosinophilic granuloma on the paw of a cat with allergic disease.
(www.icatcare.org)

DD: Xantomatosi cutanea



- Lesioni nodulari (xantomi) su muso, zampe e polpastrelli
- Patologie metaboliche o idiopatica

10/2/2018
www.dermatopatology.it/casi-clinici/un-caso-di-xantomatosi-cutanea-in-un-gatto?w2dc_action=printlisting

Dermatopatologia Veterinaria



Database di Casi Clinici

Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Abramo

Un caso di xantomatosi cutanea in un gatto



Data caso clinico: 11 giugno 2014

Autori:

Chiara Noli

- Papule, noduli, ulcere, fistole su muso, coda e arti
- Sporotricosi e Istoplasmosi = zoonosi
- Cryptococcosi: interessato SNC

DD: Infezioni fungine profonde Sporotricosi



<https://lockerdom.com>

DD: Infezioni fungine sistemiche

Istoplasmosi



<https://www.amoreaquattrozampe.it>



<http://www.dermatopatolvet.it>


Cryptococcosi

DD: Infezioni batteriche

- **Ascesso sottocutaneo**
 - Base coda, collo, spalle
 - Infezione batterica secondaria a ferita da morso
- **Granulomi da mycobatteri opportunistici (mycobatteri atipici)**
- Altre infezioni batteriche piogranulomatose:
 - attinomicosi
 - nocardiosi



<https://velvetpets.it>



- Localizzazione addominale o regione inguinale

DD: Neoplasie

Mastocitoma

- Lesioni su collo e testa
- Soprattutto adulti, ma anche gattini



<http://www.mylav.net>

Linfoma cutaneo

- FeLV
- aree alopeciche, depigmentazione, desquamazione, prurito ed eritema
- successiva formazione di placche con ulcerazione e croste



<http://www.petsblog.it>

Diagnosi Infezione da *Cowpox virus* (1)

- Quadro clinico e Anamnesi: porta a sospetto diagnostico
- Esame citologico delle lesioni ulcerativo-crostose per apposizione diretta o tramite raschiato: spesso non è diagnostico
- I **campioni di cute e/o mucosa** da inviare al laboratorio dovrebbero includere i margini delle lesioni ulcerative più recenti e le lesioni crostose (refrigerati e in formalina)
- Al laboratorio si potrà inviare oltre al campione bioptico:
raschiato cutaneo in contenitore sterile, ago aspirato, tampone da bordo lesione in soluzione fisiologica o PBS
- Confermano sospetto diagnostico:
 - ✓ **esame istologico**
 - ✓ **microscopia elettronica**
 - ✓ **PCR**
 - ✓ **isolamento in coltura cellulare**

Diagnosi Infezione da Cowpox virus (2)

Prelievo di sangue:

- la presenza di anticorpi per poxvirus nel siero indica contatto con il virus, ma insufficiente a confermare l'eziologia virale delle lesioni
- titolo antincorpale positivo circa 7-14 giorni dopo l'esposizione iniziale
- anticorpi nel siero: infezione recente (nei sei mesi precedenti)
- i test sierologici non differenziano Cowpox virus dagli altri Orthopoxvirus



Vet Microbiol. 1996 Oct;52(3-4):185-200.

A monoclonal blocking-ELISA for detection of orthopoxvirus antibodies in feline sera.

Czerny CP¹, Wagner K, Gessler K, Mayr A, Kaaden OR.

Terapia

- Non esiste terapia specifica
- Terapia antibiotica locale e per via generale ad ampio spettro e terapia di sostegno con fluidi
- I casi gravi con polmonite possono essere trattati con rFeIFN- ω , ossigenoterapia, analgesia e steroidi per via inalatoria
- Evitare assolutamente la somministrazione di corticosteroidi, a meno che non si somministri anche interferone
- FamCiclovir -> efficace contro FHV-1, contro CPXV?



Prevenzione e Disinfezione

- I gatti infetti vanno isolati e maneggiati con attenzione (è una zoonosi) , sempre indossando guanti
- Il virus può resistere nelle croste a basse temperature per anni
- Usare soluzioni a base di ipoclorito di sodio (0,5-5%), sali quaternari di ammonio, idrossido di sodio (0,8%)
- Non viene inattivato da alcool ed etere etilico
- Non esiste un vaccino specifico



Infezione da CPXV nel CANE

Caratteristiche


- Contagio tramite roditore o gatto infetto
- Nodulo solitario, ulcerato, asintomatico
- Lesioni cutanee simili ad un istiocitoma
- Guarigione spontanea



Human infections from dogs have rarely been reported, largely because the disease is so **rare in dogs** and perhaps because when they are infected, dogs tend to have **very mild disease**.



In letteratura, descritti pochi casi



Particelle virali immature intracitoplasmatiche
(Von Bomhard et al., 2010)



4 Casi di CPXV nel CANE



- Germania, 1991
- Cane meticcio di 5 mesi
- Lesione papulare sul muso
- Gatto convivente infetto

- Regno Unito, 1999
- Doberman-pinscher di 7 anni
- Lesione ulcerativa sul muso 10 mm, no prurito
- Causa: morso di un topo

- Finlandia, 2000
- Bambina di 4 a con grave forma cutanea
- Cane pet: anticorpi 1:320, no lesioni
- Trasmissione cane → uomo?

- Germania, Sassonia 2010
- Rottweiler di 5 mesi
- Lesione nodulare ulcerata 1,5 cm di diametro su arto anteriore, no prurito
- Guarigione in seguito ad escissione
- **Ceppo omologo a quello del gatto:**
per cui possibile trasmissione
cane -> gatto, cane -> uomo, roditori -> cane
- Altri animali in azienda: tutti negativi

Cowpox virus



Cow = vacca



Storia:

- isolato per la prima volta da **lesioni mammarie del bovino**
- utilizzato da Jenner nel 1700 per i suoi studi medici vaccinali pionieristici che hanno condotto al definitivo debellamento del vaiolo
- per decenni non è stato segnalato in tale specie



Curiosità -> per 150 anni: poxvirus Vaccinia = CPXV inoculato nell'Uomo. A metà novecento: riconosciuto specie a sé

Reports on spread of CPXV in western European rodents and carnivores

Country	Mode of detection	Reservoir
Great Britain	Serologic testing and PCR	Bank voles (prevalence in autumn, 80%), wood mice (prevalence, 27%), and short-tailed field voles (<i>Clethrionomys glareolus</i> , <i>Apodemus sylvaticus</i> , and <i>Microtus agrestis</i> ; prevalence, 99% [11 of 12])
Germany	Serologic testing	Cats (prevalence, 2% [44 of 2173])
Norway	Serologic testing	Wild carnivores (red foxes [<i>Vulpes vulpes</i>] prevalence, 11% [7 of 62]) and domestic cats (prevalence, 10.1% [$n = 217$]))
Finland	Serologic testing and PCR	Rodents (mainly bank voles [<i>Clethrionomys glareolus</i>]; prevalence, 0%–92%, depending on population dynamics; high prevalence during the peak phase of population for red foxes (prevalence, 50% [7 of 14]) and lynx (prevalence, 1.4% [1 of 73]))
Sweden	Serologic testing	Lynx (prevalence, 29%; [5 of 17]) and brown bears (prevalence, 2%; [1 of 45])
Germany	Serologic testing	Red foxes (prevalence, 6.5% [46 of 703])
Austria	Serologic testing	Domestic cats (prevalence, 4% [8 of 200])

bank voles



wood mice



field voles



Red foxes



Zoonotic poxviruses infection in humans

Table 1
Genera of the family Poxviridae, subfamily Chordopoxvirinae, which contain virus species that are pathogenic to humans.

Genus and virus species	Geographical distribution	Host	Reservoir
Orthopoxvirus			
Variola virus	Eradicated	Human	None
Monkeypox virus	Africa, (USA) ^a	Human, primates (see Table 2)	Squirrels, dormice, gambian giant rat, hedge hog, Jerboa, opossum, woodchuck (see Table 2)
Cowpox virus	Western Eurasia	Human, cat, cow, elephant and zoo animals (see Table 3)	Rodents (see Table 3)
Vaccinia virus ^b (~buffalopox)	Worldwide	Humans, cattle, buffalos, rabbit	Most likely rodents
Parapoxvirus			
Orf virus (contagious ectyma, contagious pustular dermatitis)	Worldwide	Humans, sheep, goat, artiodactyla, ruminant	Unknown?
Bovine papular stomatitis virus	Worldwide	Humans, cattle	Unknown?
Pseudocowpox virus (paravaccinia, melkers nodule)	Worldwide	Humans, cattle	Unknown?
Parapoxvirus of seals	Worldwide	Humans, seals	Unknown?
Parapoxvirus of reindeer	Finland	Humans, reindeer	Unknown?
Molluscipoxvirus			
Molluscum contagiosum virus	Worldwide	Humans	No
Yatapoxvirus			
Tanapox virus	Africa	Humans	Mosquitoes?, rodents?
Yaba-like disease virus	Africa	Primates	Unknown?
Yaba monkey tumor virus	Africa	Primates	Unknown?

^a Import of MPXV to the USA with gambian giant rats.

^b Buffalopox virus is a name historically used for VACV infections in buffalos and sometimes defined as a sub-species of VACV. Because buffalopox virus is officially not a taxonomically assigned name, we here use the phrase buffalopox for the clinical presentation of a VACV infection in buffalos.

Situazione Epidemiologica

CPXV nel Mondo

Zoonosi endemica: Nord Europa, aree occidentali ex URSS e zone adiacenti Asia settentrionale e centrale

negli ultimi anni, circa 200 casi umani in Gran Bretagna, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Norvegia, Russia e Italia. Casi recenti: Russia e Germania 2015, Polonia 2017



Epidemiol. Infect. (2017), 145, 755–759. © Cambridge University Press
doi:10.1017/S0950268816002922

SHORT REPORT

Cowpox in a human, Russia, 2015



Case Report

Two Distinct Clinical Courses of Human Cowpox, Germany, 2015



Lesioni di 7 gg all'avambraccio
(Pelkonen P et al, Finlandia 2003)



Lesioni necrotiche e linfangite su collo e clavicola
(Vogel S et al, Germania 2012)

Infezione da Cowpox virus nell'UOMO

- Colpiti soprattutto soggetti giovani
- Contagio da gatti, ratti domestici, animali esotici; non ancora dimostrato da uomo a uomo
- Lesioni spesso su cute, mano e collo dopo 4-14 gg
- Linfadenite e sintomi simil influenzali
- Guarigione spontanea in 6-12 settimane
- Prognosi infastidiva in soggetti immunocompromessi o sotto terapia cortisonica

Generalized cowpox infection in a patient with Darier disease

British Association of Dermatologists 2011 **164**, pp1107–1124

DOI: 10.1111/j.1365-2133.2011.10226.x



Fig 1. Partially crusted papules, pustules and vesicles (a) in the face and (b) on the shoulder at the time of hospitalization.

Diagnosi Differenziale

con forme:

- batteriche (CSD, antrace, richettsia, actinomyces)
- virali (Smallpox, Monkeypox, Herpes e Varicella, Orf)
- fungine (Sporotricosi)
- allergie da farmaco e punture di insetti.



Trattamento

- Terapia antibiotica per prevenire le infezioni batteriche
- Antivirali: Cidofovir, efficace ma causa di nefrotossicità; **ST-246** (Tecovirimat)
- Vaccino **MVA**: non protegge in assoluto da infezioni e sintomi, ma è consigliabile nelle categorie professionali a rischio

Infezione da Cowpox virus nel *Rattus norvegicus* "nuovo" Pet

R. norvegicus = ratto grigio o delle fogne e ratto da compagnia (fancy rat)

Infezione per **contatto diretto** con lesioni cutanee o fuci e per aerosol.

Lesioni più frequenti: **ulcere e croste su muso, orecchie, zampe.**
Manca il prurito, possibili congiuntivite e rinite.

Guarigione spontanea delle lesioni cutanee; se forma generalizzata,
esito fatale.



Lesioni zampe

(Campe H et al, Germania 2009)



Ratto domestico: lesioni cutanee sulle zampe
(Vogel S et al, Germania 2012)



Lesioni cutanee su muso di ratto

(Nitsche A. in Scagliarini A. La Settimana Veterinaria, 2010)

Provvedimenti legislativi - Europa e Italia

Allerta 02/2009 DG SanCo:
Commissione europea: invito agli
Stati Membri di incrementare la
vigilanza



Baviera e Renania, 2008



Oise, Noire e Loiret, 2008

Dir. Gen. Sanità Animale-Farmaco
Veterinario: nota informativa del
Ministero della Salute 0002658-P-
13/02/2009 con scheda riguardante la
malattia nell'uomo





Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Direzioni Generali della Sanità Animale e del Farmaco-Veterinario
Ufficio VIII

Uffici veterinari per gli Adempimenti comunitari (UVAC).
Lotti soli.

Oggetto: **casi umani di Cowpox virus in Francia e in Germania a seguito di contatti con ratti (“pet rats”) introdotti dalla Repubblica Ceca.**

La Commissione europea ha informato in merito a taluni recenti casi negli uomini di infezioni da cowpox virus dovuti a contatti diretti con ratti (“pet rats”).

I casi in questione si sono verificati in Germania (“Bavaria e North Rhine Westphalia”) e in Francia (12 casi) nei Dipartimenti di “Oise, Nord e Loiret”.

I ratti sono stati acquistati in diversi negozi che hanno introdotto tali animali da una struttura ubicata nella città di Kolín, nella Repubblica Ceca.

Le Autorità della Repubblica Ceca, a seguito delle indagini esperite, hanno comunicato che i Paesi interessati dalle spedizioni degli animali sospetti risultano la Francia, la Germania, il Belgio e l’Olanda e che, comunque, nel proprio territorio, nessun caso umano di infezione da cowpox virus è stato riscontrato né sono stati rilevati nelle aziende casi di malattia nei ratti.

Si può sottolineare, pertanto, come, alla luce delle informazioni finora acquisite, l’Italia non sia stata interessata dalle introduzioni degli animali a rischio.

Appare importante mettere in evidenza altresì che le Autorità francesi hanno informato che diversi ratti (“pet rats”), entrati in contatto con gli uomini risultati in seguito infetti, hanno mostrato sintomatologia respiratoria prima della morte.

Tutto ciò rilevato la Commissione europea ha comunque invitato tutti gli Stati membri ad incrementare la vigilanza sensibilizzando altresì i proprietari dei negozi degli animali in questione nonché gli acquirenti dei roditori in merito alle misure di igiene preventiva.

Si chiede pertanto agli Enti in indirizzo, in relazione alle loro prerogative e nell’ambito delle attività cui sono preposti, di prestare particolare attenzione alle movimentazioni commerciali degli animali di cui trattasi, sia per quanto concerne le introduzioni dai Paesi membri e sia nelle successive fasi di commercializzazione nei negozi.

Alla FNOVI e all’ANMVI si chiede altresì di portare a conoscenza degli episodi sopra delineati i veterinari liberi professionisti in considerazione dell’importante ruolo svolto dagli stessi nel monitoraggio e nella gestione dello stato sanitario degli animali d’affezione e compagnia e per i rapporti tenuti con i proprietari degli animali nello svolgimento della loro professione.

Infezione rara a sud delle Alpi in Italia descritti pochi casi

Alcuni dati rivelano la circolazione autoctona di orthopoxvirus nel Nord-Est d'Italia

Due casi notificati nel 2005 e 2007 in Friuli Venezia Giulia:
da gatto a studente di veterinaria e da gatto a medico veterinario

Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 15, No. 3, March 2009

Cat-to-Human Orthopoxvirus Transmission, Northeastern Italy

Fabrizio Carletti, Licia Bordi,
Concetta Castilletti,
Antonino Di Caro,
Laura Falasca, Cristiana Gioia,
Giuseppe Ippolito,
Stefania Zaniratti,
Anna Beltrame, Pierluigi Viale,
and Maria Rosaria Capobianchi

Zoonosi ed infezioni virali esotiche:
fronteggiare le emergenze attraverso un approccio integrato tra medicina umana
e veterinaria

P2 INMI Innovative protocols to improve diagnosis and therapy of zoonotic and arthropod-borne viral infections

Work Package 3: Evaluate the relevance of orthopoxviral zoonosis transmitted by wild and domestic animals to humans in Italy



GATTI: CARATTERISTICHE EPIDEMIOLOGICHE

Età (media)na)	6 anni (range, 1- 19 anni)
Gatto domestico	134 (59.2%)
Domicilio in zona rurale	108 (52.2%)
Contatti con altri gatti	173 (76.5%)
Contatti con roditori	163 (72.1%)

n=226

Positività sierologica per orthopoxvirus (Ab NT >20) = 44/226 (19.5%)

n.38 Veterinari

Positività sierologica per orthopoxvirus (titolo neutralizzante >20) = 11 (28.9%)

La percentuale di sieroprevalenza decresce con l'avanzare dell'età

nel 2011, nuovo caso in
un gatto del Friuli
Venezia Giulia; nessuna
trasmissione all'uomo
(Castilletti 2011, dati non pubblicati)

Castilletti C,
comunicazione
all'evento
"Infezione da
OPV zoonosici"
03/12/15



..... in Italia

Cowpox virus nel Lama (*Lama glama*)

Luglio 2009

- ✓ Azienda in prov. di Viterbo (circa 580 animali)
- ✓ Virus isolato da 5 lama su 7 presenti
- ✓ Morti 3 soggetti
- ✓ Presenza di Ac nei 4 lama sopravvissuti, negative altre spp animali esaminate
- ✓ Ac in 2 delle 4 persone a contatto



Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 17, No. 8, August 2011

Cowpox Virus in Llama, Italy

Giusy Cardeti, Alberto Brozzi, Claudia Eleni,
Nicola Polici, Gianlorenzo D'Alterio,
Fabrizio Carletti, Maria Teresa Scicluna,
Concetta Castilletti, Maria R. Capobianchi,
Antonino Di Caro, Gian Luca Autorino,
and Demetrio Amaddeo

Cowpox virus (CPXV) was isolated from skin lesions of a llama on a farm in Italy. Transmission electron microscopy showed brick-shaped particles consistent with orthopoxviruses. CPXV-antibodies were detected in llama and human serum samples; a CPXV isolate had a hemagglutinin sequence identical to CPXV-MonKre08/1-2-3 strains isolated from banded mongooses in Germany.




Cowpox virus nel Lama (2) (*Lama glama*)



Lesioni congiuntivali di Lama

© D'Alterio, Italia 2009

Lesioni crateriformi (Lama)
© D'Alterio G, Viterbo, 2009



- Lesioni crateriformi 0,5 cm, localizzate su tutto il corpo; soprattutto: muso, padiglioni auricolari, congiuntiva, mammella e cute perianale
- abbattimento, anoressia, decubito e morte in circa 10 giorni
- guarigione spontanea delle lesioni cutanee nei 2 malati e sopravvissuti
- Esaminati **piccoli roditori** (44 ratti e 31 topi): tutti negativi (es. virologici)

..... in Italia

Nel 2014 due ceppi di CPXV sono stati identificati in 2 bovini e 2 capre in Sicilia




Figure 3. Phylogenetic tree generated from alignment of complete orthopoxvirus (OPV) *Rpo_18* gene sequence using the neighbor-joining method and the Tamura 3-parameter model of nucleotide substitution, implemented in MEGA 6.²⁷ The percentage of replicate trees in which the associated taxa clustered together in the bootstrap test (1,000 replicates) is shown above the branches (cutoff 60%). Dots indicate the viral strains described in our study.

Evidence of zoonotic *Poxviridae* coinfections in clinically diagnosed papillomas using a newly developed mini-array test

Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
2016, Vol. 28(1) 59–64
© 2015 The Author(s)
Reprints and permissions:
sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1040638715614604
jvdi.sagepub.com

Alessandra Scagliarini,¹ Giovanni Casà, Bernadette Trentin, Laura Gallina, Federica Savini, Marine Morent, Antonio Lavazza, Roberto Puleio, Calogera Buttaci, Vincenza Cannella, Giuseppa Purpari, Patrizia Di Marco, David Piquemal, Annalisa Guercio

■ Gennaio 2015

■ in un **Centro di ricovero e recupero per animali selvatici ed esotici**, in un'area boschiva dell'**Italia centrale**



- In 2 settimane, 12 macachi di un gruppo di 18 animali, sono morti tra le 48 ore e 12 giorni dalla comparsa dei sintomi
- Grave depressione, forma respiratoria, vomito e sintomi neurologici

Papule eritematose e pustole

- su mucosa gengivale
- su regione inguinale



Lesioni cutanee e organi principali
processati per:


- **esame istologico** (ematossilina-eosina)
- **esami virologici**



Fatal Outbreak in Tonkean Macaques Caused by Possibly Novel Orthopoxvirus, Italy, January 2015¹

Giusy Cardeti,² Cesare Ernesto Maria Gruber,² Claudia Eleni, Fabrizio Carletti, Concetta Castilletti, Giuseppe Manna, Francesca Rosone, Emanuela Giombini, Marina Selleri, Daniele Lapa, Vincenzo Puro, Antonino Di Caro, Raniero Lorenzetti, Maria Teresa Scicluna, Goffredo Grifoni, Annappaola Rizzoli, Valentina Tagliapietra, Lorenzo De Marco, Maria Rosaria Capobianchi, Gian Luca Autorino

Figure 6. Phylogenetic analysis of OPV Abatino obtained from skin lesion of Tonkean macaque during outbreak at animal sanctuary, Italy, January 2015. Nine conserved genes (GenBank accession nos. KY100107–KY100115) obtained with next-generation sequencing were concatenated and aligned with the homologous concatenated sequences from representative OPV strains (GenBank accession no.): TATV-Dahomey-1968 (DQ437594.1), VARV-Bangladesh-1975 (L22579.1), CMLV-M96 (AF438165.1), CPXV-HumAac09-1 (KC813508.1), CPXV-Germany2002-MKY (HQ420898.1), CPXV-Germany1998-2 (HQ420897.1), CPXV-MarLei07-1 (KC813499.1), MPXV-Congo2003-358 (DQ011154.1), CPXV-Finland2000 (HQ420893.1), VACV-Lister (KX061501.1), ECTV-Moscow (AF012825.2), OPV GCP2013 Akhimeta (KM046934-42), and OPV Tena Dona AK2015 (KX914668-76). New World strain RACV-MD19 (GenBank accession no. FJ807746-54) was added to the analysis as an outgroup. We generated multiple alignments with MUSCLE version 3.8.31 (30) and built the phylogenetic tree by using the Bayesian Markov chain Monte Carlo model with MRBAYES version 3.2.5 (31) using the general time-reversible plus gamma model with 1 million generations, retaining a minimum of 10,000 posterior probabilities, and maximum-likelihood model RAxML version 8.1.24 (32) using the general time-reversible plus gamma with 1,000 pseudoreplicates. Numbers represent the reliability of the nodes with the minimum probability of 75% and minimum bootstrap value of 75. Scale bar indicates nucleotide substitutions per site. CMLV, camelpox virus; CPXV, cowpox virus; ECTV, ectromelia virus; MPXV, monkeypox virus; OPV, orthopoxvirus; RACV, raccoonpox virus; TATV, taterapox virus; VACV, vaccinia virus; VARV, variola virus.



..... in Italia

Nel 2016, lesioni cutanee sospette prelevate dal **muso** di un gatto in provincia di Siena, sono state inviate per diagnosi all'Università di Bari

Isolato e tipizzato un Orthopoxvirus molto simile al ceppo OPV Abatino (comunicazioni personali; in pubblicazione)



Specie esotiche-selvatiche da cui è stato isolato il virus


Elefante asiatico (*Elephas maximus*)
Elefante africano (*Loxodonta africana*)
Leone (*Panthera leo*)
Pantera nera (*Panthera pardus*)
Ghepardo (*Acinonyx jubatus*)
Puma (*Felis concolor*)
Giaguaro (*Panthera onca*)
Ghepardo (*Acinonyx jubatus*)
Ocelot (*Leopardus pardalis*)
Gatto del Bengala (*Felis bengalensis*)
Lince (*Lynx lynx*)
Okapi (*Okapia johnstoni*)
Formichiere gigante (*Myrmecophaga tridactyla*)
Rinoceronte nero (*Diceros bicornis*)
Rinoceronte bianco (*Ceratotherium s. simum*)
Lama (*Lama glama*)
Alpaca (*Vicugna pacos*)
Marà (*Dolichotis patagonum*)
Panda rosso (*Ailurus fulgens*)
Castoro (*Castor fiber*, *C. canadensis*)
Macaco (*Macaca spp.*)
Scimmie cappuccine (*Cebus spp.*)
Mangusta (*Mungos mungo*)
Jaguarundi (*Herpailurus yagouaroundi*)

Infezione da Cowpox virus

ANIMALI ESOTICI e SELVATICI

Giardini Zoologici

Infezione per contatto con ratti malati o loro feci e con altri animali infetti



Lesione occhio elefante
(Kurth A et al, EID 2008)





Fig 2. Exemplary clinical presentations for typical (A) and non-typical (B) poxvirus lesions observed during the outbreaks. A. Progression of the infection observed for Nova (cluster 5) from d2 when typical dermal nodules were clearly visible, d8 at the peak of clinical disease with multiple classical skin wounds, and d52 with remaining pox scars. Lesions were predominantly located in the face of the animal but were also distributed over the body and legs. B. Atypical ulcerative skin lesions observed on Sheppard (cluster 1). The lesion on the lower lip is shown in the inset on the right for better visibility. (d = days after first clinical signs).

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187089.g002>

CPXV - animali esotici e selvatici (2)



Lesioni su muso e lingua di Jaguarundi
(Kurth et al, Germania 2009)



Lesioni su muso e corpo di Mangusta striata
(Kurth et al, Germania 2009)

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS one

Cowpox Virus Outbreak in Banded Mongooses (*Mungos mungo*) and Jaguarundis (*Herpailurus yagouaroundi*) with a Time-Delayed Infection to Humans

Andreas Kurth^{1*}, Martin Straube², Annette Kuczka³, Anton Josef Dunsche⁴, Hermann Meyer⁵, Andreas Nitsche¹

¹ German Consultant Laboratory for Provinces, Robert Koch Institute, Berlin, Germany, ² Zoo Krefeld, Krefeld, Germany, ³ Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhine-Ruhr-Wupper, Krefeld, Germany, ⁴ Städtisches Klinikum Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, ⁵ Bundeswehr Institute of Microbiology, Munich, Germany

Abstract

Background: Often described as an extremely rare zoonosis, cowpox virus (CPXV) infections are on the increase in Germany. CPXV is rodent-borne with a broad host range and contains the largest and most complete genome of all poxviruses, including parts with high homology to variola virus (smallpox). So far, most CPXV cases have occurred individually in unvaccinated animals and humans and were caused by genetically distinguishable virus strains.

- Lesioni localizzate su muso, orecchie, zampe, mucosa oro-faringea.
- Possibili sintomi respiratori e gastroenterici o morte improvvisa.
- **Guarigione spontanea** delle lesioni cutanee; se interessamento generale, esito spesso letale.



FIG 1: Female adult squirrel monkey (*Saimiri sciureus*) with multifocal to regionally extensive, well-demarcated areas of alopecia and ulceration of the skin

Veterinary Record (2011) 169, 156b

Fatal cowpox virus infection in two squirrel monkeys (*Saimiri sciureus*)

S. J. Girling, R. Pizzi, A. Cox, P. M. Beard

Piccoli roditori: veri RESERVOIR del CPXV

Indagini sierologiche:

Europa - alta sieroprevalenza in:

- **arvicole** (*Clethrionomys glareolus, Microtus agrestis*)
- **topi selvatici** (*Apodemus sylvaticus*) e **domestici** (*Mus musculus*)
- **ratto** (*Rattus norvegicus*)
- **lemming** (*Lemmus lemmus*)



Indagini virologiche (Hoffmann et al, J Virol 2015):

mostrata recettività a 3 ceppi di CPXV:

- **arvicola** (*Microtus arvalis*)
- **ratto Wistar** (*Rattus norvegicus*)



Epidemiol Infect (1995), 115, 185-191
Copyright © 1995 Cambridge University Press

185

Serological evidence for the reservoir hosts of cowpox virus in British wildlife

A. C. CROUCH^{1,2}, D. BAXBY^{1*}, C. M. McCACKEN^{2,3}, R. M. GASKELL² AND M. BENNETT²

Departments of Medical Microbiology¹, Veterinary Pathology² and Veterinary Clinical Science and Animal Husbandry³, University of Liverpool, PO Box 147, Liverpool L69 3BX, UK

(Accepted 15 March 1995)

SUMMARY

The reservoir host of cowpox virus in Western Europe is not known, but epidemiological evidence from human and feline infections indicates that the virus is probably endemic in small wild rodents. Therefore, serum and tissue samples

Una Zoonosi emergente

Crescente popolarità di ratti e animali esotici
da compagnia
ridotta cross-protezione per cessata profilassi antivaiolosa

aumentato rischio per l'uomo di contrarre l'infezione da
CPXV

inclusa tra le Zoonosi emergenti in Europa

Segnalazione alla ASL, Dip.to Medicina Preventiva

Il virus

- ✓ **Molte varianti:** molte spp animali sensibili; più specie di CPXV?
- ✓ **Basso tasso di mutazione:** ma frequenti ricombinazioni inter e intramolecolari, delezioni, inserzioni
- ✓ **Varianti diverse che circolano nella stessa area**

Perché
zoonosi
emergente?

L'infezione

- **Alto titolo virale negli animali infetti**
- **Ampio spettro d'ospite**
- **Stop alla vaccinazione contro il VARV**
- **Nicchia ecologica lasciata libera dallo Smallpox**
- **Soggetti immunocompromessi e con dermatiti atopiche**

Infezione da Cowpox virus negli animali: studi sulla presenza e diffusione del virus in Italia Centrale

Durata 36 mesi:

inizio 01/10/2014 -> termine: 30/09/2018

Attività distribuite tra le 5 U.O.




- U.O. IMS 1 - **Biotecnologie**, dott.ssa Giusy Cardeti (responsabile scientifico)
- U.O. IMS 2 - **Lab. Anatomo-Istopatologia**, dott.ssa Claudia Eleni
- U.O. IMS 3 - **Osservatorio Epidemiologico**, dott.ssa Paola Scaramozzino
- U.O. IMS 4 - **INMI-IRCCS, Laboratorio di Virologia**,
dott.ssa Concetta Castilletti
- U.O. EMS 1 - **ASL Roma 3, Canile sovrazonale**,
dott.ssa Livia Malandrucco





Obiettivi del Progetto



Generali


- **Sensibilizzare i medici umani e veterinari alla zoonosi**
- **raccogliere dati sulla diffusione del CPXV** in Zoo e Centri di ricovero e recupero di animali esotici, tra i gatti e i "nuovi" pets della provincia di Roma, nelle persone a contatto con animali infetti
- **riscontrare sieropositività** in specie animali domestiche e selvatiche, alloctone e/o sinantropi, ed esotiche
- **analizzare i fattori di rischio** associati alla prevalenza della suddetta infezione.



Obiettivi del Progetto

Specifici

- Mettere a punto **tecniche biomelocolari** per la diagnosi di CPXV
- **Correlare filogeneticamente** i ceppi identificati a quelli precedentemente isolati in Italia ed Europa



Raccolta e invio di **Campioni per indagini di laboratorio**

Animali campionati:

- Gatti di colonia e padronali
- Animali esotici sia detenuti in Giardini zoologici, Centri di Ricovero e Recupero e simili, che nuovi "Pets"
- Animali selvatici, sinantropi e alloctoni con lesioni sospette
- Uomo



Materiale biologico da inviare all'IZS LT

Lesioni cutanee o mucose: raschiato, ago aspirato, biopsia, tampone da bordo lesione (in 1 mL di soluzione fisiologica o PBS in provetta chiusa ermeticamente).

Essudato: aspirare con una siringa ed inviare tal quale.

Sangue: per ricerca di anticorpi nel siero da animali con lesioni cutanee; da gatti di colonia, ratti, topi e animali esotici-selvatici.

Organi di animali deceputi: se sospetto clinico-anatomopatologico di CPXV, prelevare polmone, fegato, milza, intestino, coagulo intracardiaci.


Condizioni per il prelievo:

usare sempre **DPI**: trattandosi di un virus zoonosico, indossare almeno guanti e camice




Esami di laboratorio:


- visualizzazione diretta ed identificazione, su base morfologica, di CPXV al **Microscopio Elettronico**
- isolamento del virus in **Coltura cellulare**





- **Esame istologico**



- tipizzazione del ceppo virale isolato, mediante tecniche di **Biologia molecolare** (PCR Real Time e Sequenziamento)




- evidenziazione di **Anticorpi specifici** mediante SN e IF



Osservazione al Microscopio Elettronico a Trasmissione




Philips EM 208



Cowpox virus Lama

© G. Cardeti (IZSLT, Roma)



Orthopoxvirus Macaco




© G. Cardeti (IZSLT, Roma)

Isolamento su Colture cellulari

Due linee cellulari di mammifero: **Vero e BHK₂₁**



Effetto citopatico caratterizzato da *lisi cellulare*

BHK₂₁



ECP su BHK21

Vero




ECP su Vero


Esame Istologico

Porzioni di lesioni cutanee fissate in formalina, incluse in paraffina, tagliate e colorate con ematossilina - eosina


Evidenziati corpi inclusi intracitoplasmatici ed eosinofilici negli strati basale e spinoso dell'epidermide



Corpi inclusi da CPXV - Lama
© C. Eleni - IZSLT, Roma





Corpi inclusi da CPXV - Mangusta
Schmiedeknecht et al, VetPat. 2010



Analisi biomolecolare

DNA virale totale estratto dal materiale patologico e analizzato mediante Real-Time PCR specifica per una regione del gene *crmB* dell'Orthopoxvirus



Phylogenetic analysis of whole-genome sequences of Orthopoxviruses. CPXV clades (25, 28) are displayed in different colors. RatPox09, FM2292 and BR are highlighted in bold and darker colors. The Variola virus (VARV), Camelpox virus (CMLV), Taterapox virus (TATV), Vaccinia virus (VAVC), Ectromelia virus (ECTV) and Monkeypox virus (MPXV) clusters are presented as collapsed clades and include available whole-genome sequences in GenBank. (Hoffmann et al., 2015)

Indagini Sierologiche

Uomo:

- comparsa di Anticorpi dopo circa 7 giorni
- cross-immunità con Vaccino Vaiolo umano





Test di **Sieroneutralizzazione** -> Anticorpi IgG

Test di **Immunofluorescenza** -> Anticorpi IgM e IgG

Campioni di sangue di:

- gatti di colonie feline (ASL Roma 3 ed altre richiedenti)
- gatti padronali con lesioni sospette (ASL e ambulatori)
- animali esotici, selvatici, alloctoni (giardini zoologici e ambulatori; coagulo intracardiaci in sede autoptica)




Indagine Epidemiologica

Disegno del campionamento nelle popolazioni feline di colonia nella ASL Roma 3

Preparazione delle Scheda di Raccolta dati nel Gatto e negli Animali esotici

Risultati attesi:

- Prima stima attendibile di sieroprevalenza di Cowpoxvirus in Italia Centrale
- Eventuale analisi dei fattori di rischio grezzi "orientativi" (età, provenienza, numerosità delle colonie, ambiente urbano-rurale ecc..)
- partecipazione allo studio allargata ad altre ASL/province: estensione dei risultati attesi e confronto tra aree



...e con i risultati ottenuti,
costituire la "base line" per la
messa a punto di idonei
programmi di prevenzione dei
casi di malattia nell'uomo e negli
animali sul territorio...

Giardini zoologici che collaborano al Progetto

Bioparco di Roma



Giardino Faunistico Piano dell'Abatino, Rieti

Giardino Zoologico di Pistoia



Parco Zoo delle Star, Aprilia



CRASE di Semproniano, Grosseto



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*



Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Rieti

Grazie a tutti coloro che collaborano al progetto

Accettazione di Roma



Ufficio di staff Biotecnologie

Laboratorio di Anatomo-Istopatologia

Direzione Operativa
Diagnosi Malattie Virali

Ufficio di staff Osservatorio Epidemiologico

ASL Roma 3 - Canile sovrazonale

Istituto Nazionale Malattie Infettive di Roma

dott. P. Calderini
dott. E. Tomassetti



Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

a voi per la vostra attenzione
e... futura collaborazione

contatto: giusy.cardeti@izslt.it

