

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

GIA' NEL D.LGS. 626/94 il DATORE DI LAVORO
AVEVA L'OBBLIGO DI:

- ❖ METTERE IN ATTO MISURE DI EMERGENZA IN CASO DI PRIMO SOCCORSO ED EVACUAZIONE

IL D.LGS. 81/2008 PREVEDE:

- ❖ DESIGNARE I LAVORATORI INCARICATI ALLE ATTUAZIONI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA
- ❖ NELLA DESIGNAZIONE, IL DATORE DI LAVORO DOVRA' TENERE CONTO DELLE DIMENSIONI DELL'AZIENDA OVVERO DEI RISCHI SPECIFICI DELL'AZIENDA

PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

- ▣ IL DATORE DI LAVORO “TENENDO CONTO DELLA NATURA DELL’ATTIVITA’ E DELLE DIMENSIONI DELL’AZIENDA OVVERO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA, SENTITO IL MEDICO COMPETENTE, OVE PREVISTO, PRENDE I PROVVEDIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PRONTO SOCCORSO E DI ASSISTENZA MEDICA DI EMERGENZA, TENENDO CONTO DELLE EVENTUALI ALTRE PERSONE PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO E STABILENDO I NECESSARI RAPPORTI CON I SERVIZI ESTERNI, ANCHE PER IL TRASPORTO DEI LAVORATORI INFORTUNATI

(art. 15, c.1)

Decreto del MINISTERO DELLA SALUTE 15 Luglio 2003, n. 388

**NORMATIVA - REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
(pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE N. 27 DEL 2 FEBBRAIO 2004)**

SI STABILISCONO CORSI DI PRIMO SOCCORSO IN BASE AI RISCHI AZIENDALI:

- ☐ **GRUPPO A**
- ☐ **GRUPPO B**
- ☐ **GRUPPO C**

Contenuto minimo della cassetta di Pronto Soccorso

- GUANTI STERILI MONOUSO (5 PAIA)
- VISIERA PARASCHIZZI
- FLACONE DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO DA 1 LITRO (1)
- FLACONI DI SOLUZIONE FISIOLÓGICA (SODIO CLORURO - 0,9%) DA 500 ML... (3)
- COMPRESSE DI GARZA STERILE 10 X 10 IN BUSTE SINGOLE (10)
- COMPRESSE DI GARZA STERILE 18 X 40 IN BUSTE SINGOLE (2)
- TELI STERILI MONOUSO (2)
- PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO (2)
- CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA (1)
- CONFEZIONE DI COTONO IDROFILO (1)
- CONFEZIONI DI CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO (2)
- ROTOLI DI CEROTTO ALTO CM. 2,5 (2)
- UN PAIO DI FORBICI
- LACCI EMOSTATICI (3)
- GHIACCIO PRONTO ALL'USO (DUE CONFEZIONI)
- SACCHETTI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI (2)
- TERMOMETRO
- APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

COSA FARE DOPO UNA PUNTURA D'APE



TRE SEMPLICI PASSI

- ▣ **1. RIMUOVERE IL PUNGIGLIONE USANDO UN OGGETTO CON UN BORDO SMUSSATO:** raschiare delicatamente tutta l'area interessata con un oggetto con il bordo smussato, come una carta di credito o un coltello da burro.

Non usare pinzette, onde evitare di spremere la sacca del pungiglione contenente il veleno e peggiorare i sintomi.
- ▣ **2. APPLICARE UN IMPACCO FREDDO:** una volta rimosso il pungiglione, applicare un impacco freddo, come un impacco di ghiaccio, per contribuire ad alleviare il dolore.
- ▣ Un antistaminico per via orale o applicato sotto forma di crema può contribuire ad alleviare la sensazione di prurito e la tumefazione.
- ▣ **3. SOLLEVARE L'AREA INTERESSATA:** a seconda della sede della puntura, sollevare l'area interessata per contribuire a ridurre la tumefazione. Questi sintomo possono durare da poche ore ad alcuni giorni.

SHOCK ANAFILATTICO

- ▣ **SEGNI DI UNA REAZIONE ALLERGICA GENERALIZZATA**
- ▣ **ANGIOEDEMA (GONFIORE DEL VOLTO, DELLE LABBRA E DELLA GOLA)**
- ▣ **RAPIDO CALO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA**
- ▣ **INCAPACITA' DI PARLARE, SENSAZIONE DI NODO ALLA GOLA, SENSAZIONE DI MORTE IMMINENTE NON POTENDO RESPIRARE**
- ▣ **DISPNEA**
- ▣ **TOSSE**
- ▣ **CUTE CALDA E SUDATA**
- ▣ **PERDITA DI CONOSCENZA**
- ▣ **BRONCO SPASMO**
- ▣ **ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO**

Cosa fare nello shock anafilattico

- ▣ 1. ALLERTARE IL 112 – EMERGENZA SANITARIA
- ▣ 2. INIETTARE ADRENALINA FASTJEKT ADULTI 300 MCG.
- ▣ 3. CORTISONE – FLEBOCORTID
- ▣ 4. OSSIGENO (MASCHERA FACCIALE CON RESERVOIR FLUSSO 15 L./MINUTO)

COME AGISCE L'ADRENALINA

Gli effetti dell'adrenalina sull'organismo sono:

- ▣ **Aumento della gittata cardiaca;**
- ▣ **Aumento della PAS (pressione arteriosa sistolica)**
- ▣ **Riduzione della PAD (pressione arteriosa diastolica)**
- ▣ **Aumento del flusso ematico muscolare, renale e cutaneo**
- ▣ **Vasocostrizione periferica**
- ▣ **Aumento del metabolismo**
- ▣ **Broncodilatazione**

Le principali indicazioni terapeutiche sono:

- ▣ **Shock anafilattico**
- ▣ **Attacco d'asma**
- ▣ **Bradiaritmia**
- ▣ **Arresto cardiaco**

ADRENALINA

- ▣ L'ADRENALINA O EPINEFRINA: SI TRATTA DI UN FARMACO DI PRIMA SCELTA. AGISCE SUGLI APPARATI RESPIRATORIO, CIRCOLATORIO E GASTROINTESTINALE
- ▣ SI UTILIZZA MEDIANTE UN DISPOSITIVO AUTOINIETTANTE A CARTUCCIA FASTJEKT DA 300 MCG.

- ▣ **EFFETTI COLLATERALI**

- ▣ TACHICARDIA
- ▣ NAUSEA
- ▣ VOMITO
- ▣ FEBBRE
- ▣ SUDORAZIONE
- ▣ TREMORE
- ▣ DOLORE AL PETTO
- ▣ CEFALEA INTENSA

Utilizzo dell'autoiniettore di adrenalina

- ▣ AFFERRARE LA PENNA DI ADRENALINA CON LA MANO DOMINANTE
- ▣ TOGLIERE IL CAPPuccio DI SICUREZZA
- ▣ PREMERE A FONDO L'ESTREMITA' DELL'AGO SUL LATO ESTERNO DELLA COSCIA. UN CLIC INDICA CHE E' STATA ESEGUITA CORRETTAMENTE
- ▣ RIMUOVERE L'INIETTORE DOPO 10 SECONDI
- ▣ MASSAGGIARE IL PUNTO DI INIEZIONE PER 10 SECONDI
- ▣ NUMERO DI EMERGENZA (112) - SEGNALARE L'EMERGENZA ALLERGICA
- ▣ DOPO 5 - 15 MINUTI UTILIZZARE LA SECONDA PENNA SE NON VI E' STATO NESSUN MIGLIORAMENTO