

Dibattito

Criticità e problematiche nello svolgimento delle attività entomologiche previste dal PNA 2020-2025



Ermenegildi, Magliano, Del Lesto, De Liberato
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”



Ghiaccio secco

- le criticità che si sono presentate più frequentemente durante le passate stagioni sono legate all'approvvigionamento del ghiaccio secco
- necessità di stabilire un calendario delle consegne da inizio stagione
- scarsa possibilità di modifiche rispetto al calendario
- necessità effettuare cattura il giorno di arrivo del ghiaccio secco
- nonostante questo, diversi episodi di mancata consegna o di consegna di quantitativi errati da parte della ditta
- chiusura ditta ad agosto
- impossibilità consegne giorni seguenti a festività e il lunedì
- **a giugno nuova gara, con diverse ditte invitate**



Modello di calendario annuale

Anno

Mese

Giorno di inizio

[Innanzitutto un titolo per il calendario]

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

Trappola rotta, batteria esaurita, carica-batterie che non carica, ovitrappola rovesciata o sparita

- in ogni caso siamo in grado di sostituire il materiale danneggiato o sparito (con preghiera di restituire eventuali trappole non funzionanti, perché proveremo a ripararle)
- a causa della non flessibilità del calendario stabilito ad inizio stagione, in alcuni casi necessario «saltare un turno», con un intervallo tra le catture che arriva ad un mese.



Modello di calendario annuale

[Innanzitutto un titolo per il calendario]

Settimane	Settimane	Settimane	Settimane
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32

Pioggia o vento forti, ferie, mancanza di personale

- posizionamento trappola inutile in caso di pioggia e vento forti
- alcune catture annullate per mancanza di personale ASL, soprattutto nei periodi delle ferie
- anche in questi casi, il calendario non permette flessibilità, dunque a volte intervalli tra catture successive che superano il mese


**Necessità di trovare siti nuovi per indisponibilità allevatore,
chiusura attività o catture troppo scarse**



Non necessario posto con equini




Porcilaie e pollai molto attrattivi nei confronti di *Culex pipiens*



Interruzione catena del freddo

- RNA virale della WN estremamente degradabile
- se catena del freddo non mantenuta spreco tempo e denaro e possibili falsi negativi
- diversi episodi con AASSLL del Lazio




**Zona interessata dalla
circolazione virale con
sorveglianza entomologica
attiva**

**Ma no pool di zanzare
positivi**

Legenda

- ◆ Sorveglianza Positività
- Trappole PNA
- Celle 20x20km Toscana
- Confini Toscana



Piano Nazionale di Sorveglianza WND/Usutu

Aree Alto Rischio: attività previste


- Sorveglianza su uccelli



- Sorveglianza entomologica



- ~~• Sorveglianza negli equidi~~



- Sorveglianza su mortalità uccelli selvatici



Criticità gestione ovitrappole monitoraggio zanzara tigre



- **Difficoltà reperire personale per gestione ovitrappole**
- Una volta attivo il monitoraggio, le bacchette devono pervenire in IZS con cadenza regolare
- Spesso ovitrappole: rubate/persa bacchetta masonite/spostate o manomesse → se succede più volte durante la stagione, necessaria nuova postazione, in un luogo più riparato